

虫，切根虫、潛蠅等，於發芽後3~5天，噴90%納乃得可濕性粉劑2000倍防治。開花期，發生小綠葉蟬、擬尺蠖、夜蛾及毒蛾幼虫等，使用45%一品松乳劑1000倍或90%納乃得可濕性粉劑200倍防治。結莢期為防除椿象類，白緣螟蛾及夜蛾幼虫等，使用50%加保利可濕性粉劑500倍，或90%納乃得可濕性粉劑2000倍。栽培期中發生紅葉滿時，被害葉片基部或全葉呈現無數灰白斑點，在嚴重時葉片向葉背捲縮黃化甚者落葉，防治以50%加力可乳劑或氯克滿乳劑，每公噸用量1公升，稀釋1000倍。

收穫與貯藏

當植株葉片黃化脫落，豆莢完全變色，子實硬度增加即為收穫適期。收穫時可以利用豆類聯合收穫機一次完成採收及脫粒作



外銷毛豆(蔬菜用大豆)經機械篩選後，再由人工精選。

業。大豆收穫種子曝曬2~3天，使種子含水量降至12%以下，即可出售。貯藏種子含水量應乾燥至10%以下，並盛於PE塑膠袋內密封。外層加塑膠編織袋，放置在通風，乾燥、低溫地方貯存。

※

中日技術合作(KANEKO)

順光一心子

超級8槽式

日本特許第1392210號


稻谷
玉米
高粱

乾燥機




EC-505B

八槽式6大特點：

- 高效率乾燥
- 特殊構造，耐久性
- 自動清除，零殘留



- 昇降機可前後對調
- 排風方向任您選擇
- 安全控制構造



耗油量：1~6公升/時(煤油或高級柴油)

一次稻谷一五〇〇~七〇〇〇台斤
玉米二〇〇〇~八五〇〇台斤

經測定合格[®]等廠商

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號
TEL：(02)2606111~6-2608611

農機經銷商

台北：(02)6794682
桃園：(03)4773863
3264387
新竹：(035)885886
台中：(04)3393767
(045)621196

彰化：(048)733627
523950
雲林：(056)324879
(055)862167
嘉義：(05)3792470
台東：(089)811345

花蓮：(038)882586
台南：(06)6563821
6852117
高雄：(07)6210559
6212559
6851987
屏東：(087)883386