



7～9月主要農作物病虫害防治備忘錄④

台東地區

資料提供／台東區農業改良場

台東區農業改良場區內7～9主要作物夏季主要病虫害防治備忘錄

項 目 (作物名稱)	主要病虫害 種類	症 狀	防 治 對 策	執 筆
果 樹 類 番 茄 枝 (釋迦)	乾旱：正期 果開花不結 果	花器之雌蕊(柱頭)黏稠性降低，雄蕊(花粉)無法成熟，結果率極低。	1. 乾旱期應於凌晨12時至翌晨6時，全園以黑色塑膠軟管噴水，提高果園之微濕度。	謝進來
	薊馬 蚜虫	為害嫩梢及花器造成心葉捲曲並有物理疤痕。蚜虫吸食心葉及花器造成發育不良。	1. 全園噴水降低密度 2. 以48.34%丁基加保扶1,500倍全園噴藥防治	
木 瓜	赤葉蟬	為害木瓜中、老葉，形成鑷色斑點，嚴重造成落葉。	1. 木瓜園乾旱期需噴水提高濕度降低葉蟬發生 2. 20%西脫蟬1,500倍全園噴施	
柑 桔	葉蟬 銹蟬	乾旱期較易發生為害，被害葉片呈鑷色斑，果實外觀有褐色疤痕。	以50%芬布賜2,000倍全園噴施	

農業土質改良的 最佳利器!!

昭和酵素Sの姉妹品

話題の総合活性土壤改良剤

昭和酵素S

要避免，作物連作，產生障害
要改良您的土壤
請靠昭和酵素S之力量!!

在土中之綠肥或前期作物之殘留根莖等物，昭和酵素S，可促其提早分解腐蝕，增加土壤有機質，提高肥效及土壤活力。

話題の酵素消毒剤

昭和酵素Hi-S

ハイ エス

「昭和酵素Hi-S」是「昭和酵素」的姊妹品，經過一再的研究改良，享有生物成長微量要素之美名的強力新製品。

利用酵素威力驅除病蟲害

促進綠肥或前作物的根莖等土壤中的有機質腐蝕分解，尤其可增進農作物生育、防止病蟲害。

株式會社 昭和酵素研究所

誠徵：全省各縣市經銷商

台灣總代理：大倫貿易有限公司

住址：南投縣名間鄉董門巷14-2號
電話：049-732019・732606

葡萄柚	潰瘍病	葉片及果實上出現褐色瘡疤狀病斑。	(一)於風雨前後施用波爾多液、鋅乃浦、氧化亞銅或嘉賜銅等藥劑。 (二)果園附近種植防風植並注意清除罹病枝葉。	黃德昌 (李惠玲 修訂)
玉米	葉斑病	葉片上形成淡黃色至紅褐色成紡錘形或橢圓形病斑。	施用鋅錳乃浦，每7天噴酒一次連續3-4次。	
百香果	疫病	葉片或果實上呈現水浸狀斑塊。	(一)風雨前後，施用福賽得鋅錳乃浦或鋅錳滅達樂。 (二)注意果園內排水及通風。	
結球白菜	軟腐病	初期呈萎凋後，基部軟腐整株倒伏。	(一)注意田間排水及衛生，並防除田間昆蟲。 (二)發病初期施用多保鏈黴素於地際部。	
木瓜	疫病	果實上出現水浸狀小點而後泌膠並於高濕下產生白色菌體，也會發生於地際部。	(一)注意果園排水。 (二)避免種植感病品種。 (三)風雨前後施用鋅錳乃浦。	
蝴蝶蘭	軟腐病	導致葉片軟腐。	(一)避免過度噴水。 (二)避免密植，清除病株。 (三)參考採用四環黴素或多保鏈黴素施行化學防治。	
玉米	玉米螟	被害處有針刺狀小孔及長條型之食痕，其上覆有如鋸屑狀之排泄物。	釋放赤眼卵寄生蜂。	
番荔枝	斑蟊蛾	為害果實呈局部黑化進而整粒木乃伊化可見排出虫糞。	(一)檢除田間被害果。 (二)參考現撲滅松或陶斯松施行防治。	

農作物栽培網

● 省時省工 ● 降低成本 ● 提高產量



- 適用於：
莖類、爬藤類、瓜果類、蔬菜類
- 用途：
防風、防雨、防止倒伏、不易發生蟲害、方便採收
- 大量減少農藥使用次數

● 主要產品：

花網／瓜網／芹菜網／蔓草網／豌豆網／防鳥網
洋香瓜地面網／甜椒網／蕃茄網／辣椒網／絲瓜網／
蔥網／大蒜網／蘆筍網／茄網／萬年青網／

● 其他主要產品：

漁業養殖籠／運動網／安全護網

欣隆製網股份有限公司

工廠：彰化市彰南路174-1號

電話：(047)524625、613567

傳真機：047-611750