

→ 好以防塵垢和虫類進入。

(6)泡製後3天內每日早晚各以竹棍攪拌3~5分鐘(竹棍使用前先以熱水消毒),以後每天攪拌一次,直到液面開始起泡為止,必要時再加些微生物及黑糖。

2.糖醋液之配製與噴施法

黑糖微生物與釀造醋之配合濃度因作物種類,生長時期與生長狀態而不同。必要時可以添加其他營養元素以調節作物之生理狀態。下面是按照水稻設計之配合方法。

表6. 為生產良質米並提高產量之糖醋液

噴施時期	黑糖微生物液	釀造醋	第一磷酸鈣	氯化鈣	第一磷酸鉀	硫酸亞鐵	鉬酸鈉	備註
1. 育苗期	300倍	200倍						移植前2~3天
2. 幼穗形成期	250~300倍	150~200倍						
3. 幼穗期後3~4日	250~300倍	150~200倍	50g	40g		50g		第二回噴施無效時再噴
4. 出穗前	200~250倍	70~150倍						每分地200~300公升
5. 出穗後3~4日	200~250倍	70~150倍	50~60g	80~100g		50~60g		第四回噴施無效時再噴
6. 採收前10~20日	200倍	200倍	60g	100g	60g	40g	20g	無倒伏危險時用20天前較好
7. 採收前10~20日	150~200倍	70~100倍	60g	100g	60g	40g	20g	有倒伏危險時用必要時再增加一次

肥效長久 後勁十足

肥料登記證：北進質字10501號



請認明商標

原裝進口 歷史悠久

土壤改良 最純正
最佳有機質肥料

泰國蓖麻粕

含有成分：

氮 5.5%
鉀 1%
磷 2%
有機物 65%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、婆羅、花卉、竹筍、中藥。

泰國蓖麻油工業公司出品

台灣總代理 泰坦企業股份有限公司

(02)7044259

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社