

→ 斤、磷肥：60公斤，鉀肥：50公斤。氮、磷肥之量及鉀肥之全量作基肥，其餘半量氮肥及磷肥作為追肥，於幼穗分化期施於根際，並進行中耕培土。

(5)灌溉：於幼穗形成期及抽穗期時，若土壤乾旱應予灌溉，此外，幼穗分化期及乳熟期應避免浸水。

(6)病蟲害防治：生育初期應防治玉米螟及潛蠅之危害，生育中、後期應防治玉米螟、銹病及穗夜蛾危害，防治方法請參考農林廳植物保護手冊，並注意鳥害減少產量之損失。

(7)收穫：當果穗基部變黑褐色或由基部往上1/5部位之子實達成熟堅硬時為收穫適期。脫粒後再乾燥使子實含水量降至13%以下，夾雜物少於2%，即可包裝運繳農會收購。

2.夏作（宿根）

(1)切莖時期：收穫後即時切莖，最遲應於6月底前實施，以免影響後作。

(2)母莖高度：母莖約留1~2公分高，不宜太高，致側芽數過多影響產量。

(3)土壤水分：切莖前如土壤過於乾燥，應先灌溉再行切莖，以確保側芽生長正常。

(4)施肥量與方法：與春作相似，即每公頃氮肥：100公斤，磷肥：60公斤，鉀肥：50公斤，分兩次施用，第一次在切莖後施用氮、鉀肥之半量及磷肥之全量培土，離母莖10~15公分處，然後覆土；其餘半量氮肥及鉀肥做為追肥，於幼穗分化期施於根際，隨後進行中耕。

(5)其他田間管理及病蟲害防治，可比照春作栽培法實施。

(6)應防鳥害發生，以減少產量之損失。

三冠CONWED®防鳥網

葡萄、蓮霧、草莓、蝦池最適用

- 美國進口，網目固定、重量輕、無毒、經濟耐用，全園覆蓋，搭設簡易。
- 規格：寬4.26m×長100m，孔目19%×17%，各種鳥類都無法侵入。
- 時用時機：葡萄剪枝後，蓮霧催花期，草莓結果時。



煥坤企業股份有限公司

地址：彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號
TEL：(04)7773878(總機) FAX：(04)7789778



三冠牌懸掛式遮光網

通風、不怕強風，屋頂搭設最適宜

- 搭設不受地形限制，山坡地、畸零地張掛容易，使用方便。
- 遮光層厚，下擺隨風飄動，光線柔和分散且富變化，像處在森林般清涼。
- 突破傳統平張式遮光網使用的新觀念，立體垂掛式破損率低，更替容易。
- 遮光率視需要可調整。

三冠牌遮光網

- 最寬幅達8.5m，不必縫接，方便、省工。
- 平織、針織、羅紋織皆有，規格齊全，最多選擇。
- 強韌耐用，耐候性特佳，伸縮性小。

三冠牌鋁箔遮光隔熱網

- 具有遮光、降溫、防蟲三重效果。
- 適合國蘭、高級草花、溫室、水耕、育苗等場合使用。