

線虫造成植物衰弱病徵四季不同

由植物病原線虫引起的柑桔樹勢衰弱常表現出微量元素欠缺、葉片數減少、梢枯、小果及果實品質降低等徵候，有別於黃龍病與裾腐病。更仔細觀察的話，可於一年四季中看出其病徵，茲分述如下：

春芽萌發期：小葉、落葉、落花，葉片單薄。

小果期：落果。

果實發育期：葉片呈現缺氮及缺鎂、錳、鐵等微量元素徵狀，捲葉、枝枯及梢枯。

果實成熟期：葉片黃化，果實大小及品質不一。

冬季：黃葉、落葉。

一般而言，線虫之傳播主要由土壤、水



柑桔根部內成群之根腐線虫。

及種苗攜帶為多。農友們常於柑桔衰弱株旁預植一株苗，以便他日長成後取代衰弱株。但是該苗株在結果第2年時，上述病徵便一一出現，因根系已嚴重遭鄰近衰弱株或已高密度存在於該園土壤中之病原線虫危害了。

登記證北進微字06003號

SOLUBOR

缺硼症：最佳、唯一的補充與預防

車馬牌水硼“地中寶一號”

水硼：葉面噴灑專用、吸收快速(補救)

硼素：土壤佈施專用、持久性長(預防)

早有口碑，再度擴大推廣，期間特價供應，資料、樣品備索
歡迎各地有意推廣或需要來函詢問



台灣進口總經銷：

京聯實業有限公司

台北市瑞安街135巷6號

總機 02-7020141

FAX 02-7094366