

# 農作物、畜禽、水產及茶桑 病虫害防治備忘錄(上)

10~12月本省主要農作物的病虫害防治資料，因篇幅所限，將分兩期刊出；本資料仍由各區農業改良場等推廣研究單位提供，資料若與去年相同，為節省篇幅，不再重覆刊出，請農友自行翻看41卷20期。

## 桃園地區

資料提供／桃園區農業改良場

桃園區農業改良場區內主要作物10~12月病虫害防治備忘錄

項 目	可能發生之病虫害	症 狀	防 治 方 法	備 考	執 筆
十字花科	細菌性黑腐病	由葉緣開始形成V形黃斑，逐漸向主脈擴展，而後病部褐化乾枯結球切開可見維管束變黑並向主莖延伸。	1. 清除發病殘株並實行輪作，三年內避免種植寄主植物。 2. 種子以醋酸銅或醋酸鋅溶液於35~40°C下浸20分鐘消毒。		葉俊巖
	露菌病	葉上表面形成黃色角斑，下表面之相對位置佈滿白色霜霉狀物。	1. 藥劑可使用錳乃浦或鋅錳滅達樂之類防治。 2. 疏株或苗以改善通風及日照。 3. 種子以銅滅達樂消毒。		
	菌核病	下位葉先呈軟化下垂，而後全株水化狀腐爛，並可於地面發現黑色鼠糞狀菌核，與佈滿白色菌絲之植物殘體。	1. 盡量清除罹病作物殘體，與菌核。 2. 發病初期施用免克寧50%WP，七天施藥一次，共三次。		
柑桔	青霉病 綠霉病	果皮表面初生水浸狀斑點而後擴大其上產生青或綠色霉狀物邊緣生白色菌絲帶。	可於採收前四天噴灑腐絕或克熱淨，或於採收後包裝前，以前列藥劑浸漬三分鐘，陰乾後再包裝。		