

表2.蒜園推荐使用殺草劑種類、方法與防除對象

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
23.5%復祿芬乳劑 (oxyfluor-fen)	1公升	800	栽培後均勻噴施畦面		小葉灰藿、牛筋草、馬唐草、野萵、馬齒莧、節節花、滿天星
35%伏寄普乳劑 (Fluazifop-butyl)	1.5公升	660	定植後雜草萌芽至3~6葉(10公分以內)時施藥		牛筋草、野稗及其他禾本科雜草,尤其對自生稻更有效
34%施得乳劑 (Pendimethalin)	3.5公升	180	栽培後畦面禾本科雜草萌芽至1~2葉時將藥劑均勻全面噴施	施藥時田間應保持濕潤狀態	鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧

→ 為每10~15天灌水一次。由於大蒜根淺，不耐淹水，遇有下雨，應隨時注意排水。

5.中耕、除草、除蘖

追肥施用前應中耕除草，拔除分蘖或兩

合瓣之小株。中耕不可過深，以免傷害根部。亦可施用殺草劑防止雜草，大蒜田可用的殺草劑與使用方法如表2。（依據81年農林廳編印植物保護手冊。）



益可淨[®] 獨佳[®]

即將上市!

敬請期待!

美國意可敬生技公司是研究和發展有效且兼顧並維護環保最力之生物製劑的先鋒公司，其產品絕對值得您信賴，敬請熱切期待。

國外製造元：**ECOGEN[®]** 美國意可敬生技公司

臺灣總代理：



嘉農企業股份有限公司

新竹市南隘里柳仔浦46號
TEL : (035)762122-7