

		緣褐色，有時數個病斑癒合成虎斑狀。稻穗受害呈污綠色。可在病斑及附近看見初呈白色後變褐色之菌核。	2.化學防治：（任選一種）3%維利黴素溶液1000倍3%保利黴素溶液1000倍5%福多寧可濕性粉劑3000倍75%滅普寧可濕性粉劑1000倍16.5%滅紋乳劑2500倍
	白葉枯病	病徵分為三種，第一種為波浪形病斑，由葉尖成波浪，形向下蔓延到葉片的基部。第二種係條紋狀，能使葉片枯死，尤其在颱風過後所造成的病徵大多屬於此類。第三種為急性萎凋型病徵，約插秧後30天開始發生，發生秧苗可枯萎死亡。	1.避免種植易感染此病的品種。 2.病原細菌由傷口侵入稻株，所以儘量減少造成傷口的機會。如直播、鑿秧移植等。 3.避免偏用氮肥。 4.藥劑防治：10%克枯爛100倍。6%撲殺熱粒劑，每公頃30公斤，於幼穗形成前施藥1次。
玉 米	銹病	幼期葉部即可被感染，初期呈現黃色針眼狀病徵，後隆起，突破表皮露出如鐵銹狀物。普通型病斑由圓形而長形，褐色到深褐色，南方型病斑略小，呈圓形到卵圓形，色較淡。玉米成熟時，銹病病斑漸變為黑色，此為冬孢子。	1.充分施肥，三要素力求平衡，不可偏施氮肥。 2.發病初期以80%錳乃浦或65%鋅乃浦可濕性粉劑400倍噴施。
	葉斑病	本病易發生於幼苗期，病斑初呈針眼狀呈淡褐色至紅褐色，後轉為紡錘形或橢圓形，中央變為褐色，邊緣為深褐色。	以80%錳乃浦可濕性粉劑400倍或65%鋅乃浦可濕性粉劑400倍防治。

## 農作物栽培網

● 省時省工 ● 降低成本 ● 提高產量



- 適用於：莖類、爬藤類、瓜果類、蔬菜類
- 用途：防風、防雨、防止倒伏、不易發生蟲害、方便採收
- 大量減少農藥使用次數

### ● 主要產品：

花網／瓜網／芹菜網／蘭草網／豌豆網／防(捕)鳥網／洋香瓜地面網／甜椒網／蕃茄網／辣椒網／絲瓜網／葱網／大蒜網／蘆筍網／茄網／萬年青網

### ● 其他主要產品：

漁業養殖籠／運動網／安全護網

## 欣隆製網股份有限公司

工廠：彰化市彰興路174-1號

電話：(047)524625·613567

傳真機：047-611750