

→ 虫有葱薊馬及花薊馬兩種，薊馬主要為害葱之葉部以及花器等部位，以致使產量減少品質降低。薊馬為害青葱作物，一般而言，在蘭陽地區有兩次盛期，第一次是在4至5月，第二次是10至11月，該虫發生之密度，與降雨量及降雨日數具有密切的關係。葱薊馬如果遇到適宜寄主與氣候環境，能於極短的時間內以驚人的速度自低密度增殖到高密度。薊馬因虫體小，而具有隱密性，成虫具負趨光性以及不耐熱性。一般都產卵於葉鞘部或葉肉組織內，若虫孵化後喜匿藏葉鞘基部或折摺葉內挫食，因此防治非常困難，一年發生6~9世代，卵期4~10天，若虫期10~15天，蛹期1~2天。

2.防治方法：

當發現薊馬為害狀時，即以2.8%畢芬寧666倍，或50%馬拉松溶液1,000倍噴灑消除。

根 蟎

1.發生與為害情形：


在蘭陽青葱專業區根蟎主要有羅賓蟎及長毛根蟎等。根蟎因體型細小，又生活於土礫和植物根部（或根際）組織中，不易被發現，又其為害狀與植物病害相似，亦不易引起人們之注意，根蟎主要為害葱株地下根部組織，受害葱株新長之分蘖細短而扭曲逐漸使老葉枯死，最後衰敗死亡，嚴重發生時，呈現缺株現象，產量與品質大受影響。

2.防治方法：

耕耘葱田時將土壤深耕曝曬或利用土壤消毒等，可降低下一代根蟎密度，當發現為害時可輪流施用25%普硫松乳劑500倍，50%益滅松可濕性粉劑500倍，24%歐殺滅溶液750倍等農藥。



MA-200 日本原裝單軌搬運車



用途：採收、施肥、澆水、巡視山園。

- 特點：
1. 搬運速度快、性能安全、機動性高。
 2. 急傾斜山坡地形使用，效率一級棒。
 3. 節省人力、工資，精緻農業必備。
 4. 操作簡便，保養容易，經濟效益大。
 5. 施工時不會破壞地面，可確保水土保持。
 6. 風雨中照常使用，行駛時平穩不傷果皮。
 7. 果園、林場、工地、工廠等場合適用。

台灣總代理：亞來股份有限公司

台北市羅斯福路三段240巷14號4F
 電話：(02) 3687932~3 FAX：(02) 3672143
 東勢營業所(04) 5872789 梨山營業所(04) 5981554
 桃園倉庫(03) 4701455-6 5981969