




合成劑誘引雄蛾的情形

洛蒙，其交尾率為45.1%，同時期在風洞內自由飛翔的交尾率達87%。網室試驗亦顯示Z11-14:Ac有擾亂或阻礙交尾的作用。

兩種防治方法之比較

性費洛蒙用於防治有擾亂法及大量誘殺法兩種。茶姬捲葉蛾的防治若用擾亂法，則根據網室試驗的資料推算，每公頃每次需要



性費洛蒙誘引劑注入塑膠微管後固定在誘虫盒蓋內



7,500毫克的性費洛蒙，而大量誘殺法每公頃每次約需5毫克，顯然擾亂法性費洛蒙的成本太高。大量誘殺法雖然在田間須設置誘虫盒，對田間操作多少有些不便之處，但性費洛蒙用量少，成本低，依目前性費洛蒙並未大量生產的狀況下，茶姬捲葉蛾宜採用大量誘殺法防治之。






大家的銀行——

合作金庫

TAIWAN COOPERATIVE BANK

農家綜合貸款、休閒農業貸款
 農家住宅貸款、加速農建貸款
 養殖漁業貸款、建造漁船貸款
 災害復興貸款、漁船週轉貸款
 污染防治貸款、農企業貸款

總庫・台北市館前路77號
 電話・3118811 (分轉各單位)