

攝食藻類以外的食物。養在實驗室的魚，最喜歡吃管絨苔，但野外的魚還喜歡吃許多其他的食物。臭肚魚的攝食活動在早上比較旺盛，到了晚上就比較不吃東西。飢餓過的星臭肚魚餵以硬毛藻，二週後可使肝細胞恢復原狀，但是餵以其他食物如下雜魚、粒狀魚料、醃類或碎肉，對於肝細胞仍有不良影響。所以剛完成變態的仔稚魚以硬毛藻取代豐年蝦有助於肝細胞的發育。

星臭肚魚稚魚能夠利用飼料中的脂肪與碳水化合物，可將蛋白質節約下來而用於生長，提高比生長率。

### 種魚的營養

池塘養殖的星臭肚魚，餵以2%體重的市售飼料（蛋白質含量42%）就足夠了，種魚若餵以更高蛋白質含量的飼料可促使每月產卵。種魚的年齡越大，其受精率、孵化率與魚苗品質也會降低。有的研究認為，種魚

的飼育只要投餵低能量蛋白質高灰份的飼料就可以了，可是為了促使種魚產卵，必須投餵高能量蛋白質低灰份的飼料。報告指出，在飼料中添加10%鱈魚肝油或卵黃素，至少可使種魚連續4個月都產卵，最高記錄可達13個月。對星臭肚魚的產卵數與魚苗存活率而言，種魚配合飼料的脂肪含量方面，含18%者較含12~15%的好。

### 疾病

星臭肚魚的種魚常感染外部寄生蟲 *Caligus epidemicus*，發生這種情形可注入淡水降低鹽水，2~3天後能除去寄生蟲。養殖的臭肚魚也常感染線蟲，會造成食慾不振，甚至引起肝臟壞死或纖維化。另外，感染革蘭氏陽性菌和糞鏈球菌 *Streptococcus faecium* 腐敗假單胞菌 *Pseudomonas putrefaciens* 也可能引起大量死亡，臨床症狀為體色退色、出血及眼球凸出等。

#### 三冠 CONWED 防鳥網

##### 葡萄、蓮霧、草莓、蝦池最適用

- 美國進口，網目固定、重量輕、無毒、經濟耐用，全圍覆蓋，搭設簡易。
- 規格：寬4.26m × 長100m，孔目19% × 17%，各種鳥類都無法侵入。
- 使用時機：葡萄剪枝後，蓮霧催花期，草莓結果時。

#### 三冠牌聚脂鋼線 (PET WIRE)

##### 棚架搭設最佳經緯線材料

- 伸縮性小，拉力強，打結容易（免工具）又牢靠。
- 重量輕，施工簡便，省時省工。
- 耐腐蝕，堅固強韌，使用年限久。
- 表面光滑且導熱性低，不傷作物枝藤及網製品，是替代鐵線、鋼絲最佳資材。
- 規格：防鳥網使用場合，葡萄棚架搭設、木瓜網室、蔬菜網室等。

#### 三冠牌煥坤型簡易溫室

##### 適合亞熱帶氣候使用的溫室設施

- 標準式規格：寬6.2m × 長22m。
- 採用日本進口農藝專用強化不銹鋼管，彈性、強度特佳。質輕強韌，耐腐蝕。
- 具多用途性，可自行施工、搭設、拆解簡易。
- 拱型鈹管間距50公分，結構安全。配合使用三冠牌各種優良遮光、防蟲、防雨資材及零組件，堅固、可靠、耐久。
- 部品齊全，自由選擇，方便實用。

#### 三冠牌遮光網

- 最寬幅達8.5m，不必縫接，方便、省工。
- 平織、針織、羅紋織皆有，規格齊全，最多選擇。特殊規格需求，本公司專業加工承製。
- 強韌耐用，耐候性特佳，伸縮性小。

#### 三冠牌鋁箔遮光隔熱網

- 具有遮光、降溫、防蟲三重效果。
- 適合國蘭、高級草花、溫室、水耕、育苗等場合使用。

#### 其他農業用資材：

三冠牌農業用遮光網系列產品、木瓜網、防風網、防虫網、濾塵網、高級紗窗網、雜草抑制蓆、煥坤型簡易溫室及零組件。