

高爾夫球場上，果嶺 (Putting Green) 球道 (Fairway)，發球區 (Tee)，和其他外圍區域 (Rough)，割草的高度，頻率，型式都不一樣。果嶺上大多1~2天割一次，割草高度約0.19~0.25吋之間，使用8~9刃紡車型割草機，由4個相對方向進行。球道割草高度約0.5~1.2吋之間，每星期2~3次，使用5~10刃的紡車型割草機。發球區的割草高度約在0.3~1吋之間，大約介於果嶺和球道之間，當球頂在球釘上時讓球員感覺正好在葉子表面。每星期割2~4次，使用6~8刃的紡車型割草機。當然最正確的割草方法還是得依品種和氣候環境等因素來決定。至於其他的外圍區域割草高度約在1.5~3吋之間，5~10天割一次，但有些用在正式比賽的球場，則留4吋的高度以增加困難度。目前美國高爾夫球場已使用較輕型的割草機來取代過去重型的割草機，以免留下走過的痕跡。而在割草機上也附加一個機件 (


Grower)，可以割草的同時讓草先豎立起來以方便割草，因為一般的草並非是直生長的而導致割草不勻稱。還有一些用搖控的割草機或用雷射割草都是最近的新發明。目前在高爾夫球場，生長抑制劑也被用來抑制生長旺盛期間草皮的生長以減少割草的頻率，例如Paclobutrazol (PP-333)、Maleic hydrozide (MH-30)、乙烯等。這些抑制劑的利用必須合草皮品種，環境特性，氣候等，千萬不可隨意使用以色反效果。這些抑制劑的使用減少割草的頻率，相對地也減低染病的機會，例如細菌性萎凋病 (Bacterium Wilt)，幣斑病 (Dollar Spot)，紅線虫感染病 (Red Thread) 等。但抑制劑的使用是無法百分之百取代割草的，仍然要配合正常的管理。

割下的草如何處理？

另一個由於割草所衍生的問題，值得業

水稻白葉枯病的救星

台北農藥廣告字第80142號
農藥進字第1114號



枯 菱 寧

稻田白葉枯病免煩惱
使用10%枯菱寧直搖桌 (眞讚)
(クースケセ)

治療預防速效上蓋好
省本豐收大家擁謳茗 (讚賞)
(セケセ)

枯菱寧的特點

1. 預防兼治療的效果
2. 系統性
3. 速效抗性低
4. 雙重療效
5. 安全

全台農藥有限公司

台北市復興北路402巷8弄4號4F
TEL: (02)5098194