

衛生保健系列⑯

如何正確服藥

「水能載舟，也能覆舟」，藥物也有相同的作用。要如何得到藥物的好處，而避免害處呢？首要重點是服藥前最好先告知醫師個人的體質和疾病史，以選擇適合自己的藥物。

了解自身狀況

以目前本省最常見的蠶豆症（G6PD缺乏症）患者為例，氧化力較強的藥物，譬如阿斯匹林或是蠶豆等，應儘量忌口，以免發生溶血反應。又如乳酪、起司等食品因含有Tyramine，可能讓血壓升高。

因此若自己有類似對某些藥物、食品或特殊物質過敏及異常反應的經驗，例如皮膚起疹子或是引起不安的心悸等，應該牢記這類物品的名稱，並提供給醫師和藥師作為開藥的依據及參考。

有些藥品因製劑上的需要，如水劑中大多添加鈉鹽、糖漿等，雖然這些不是藥品的主要成分，但也會隨著服藥，無形中增加了鹽或糖份的攝取量。因此，正在進行一些飲食節制計畫的人，如患高血壓、心臟衰竭，或是腎臟病、糖尿病等病患，

應該儘量小心才好。

更重要的是病患切莫任意服用他人的藥物，以免造成不良反應。另外保健藥品如維他命、阿斯匹靈等。雖然醫學研究中顯示可抗癌、防止老化及血管硬化的功能，但是仍應避免服用過量，尤其脂溶性維他命A、D、E等無法隨水分排出體外，不宜多服，以避免藥物中毒；曾有腦出血病史者服用阿斯匹靈，容易加深出血的危機。

婦女用藥須知

懷孕或正預備懷孕或未避孕而有可能懷孕的婦女，應該儘量避免服用抗過敏或荷爾蒙製劑。近年來市面上的藥物，多數均依懷孕用藥安全性分為A、B、C、D、X五級，愈前項的藥品安全性愈高，絕大多數藥均在C級以上，一般藥師則開列B級藥物給孕婦服用。

不過部分孕婦因本身的疾病需要，如癲癇病人若中斷服藥，可能因此導致癲癇發作、身體痙攣等，對孕婦和胎兒健康影響甚大。因此病患應遵守醫師的指示，不可私自中斷服藥，危及母體

和胎兒的安全。除了孕婦外，哺餵母乳的婦女也應慎服藥物，有些藥品會藉哺乳母乳時流至嬰兒體內，因此餵奶時應儘量避免用藥。如果必須服藥，應詢問藥師，設法將餵奶的時間和藥物在血中達最高濃度的時間錯開。

服藥的禁忌

某些疾病會影響藥品在體內的作用，如肝腎功能不良者，會延後藥品自體內排出的時間，加強藥品毒性，因此應事先告知醫師，避免開藥性過強的藥物。此外，過去數週或目前正服用某些藥品的病患，最好就醫前記下藥品名稱，以供醫師參考。

藥物多少都有些副作用，但只要遵守藥品包裝上的注意事項，多數藥品副作用都會為人體逐漸適應，僅有少數藥物，如抗過敏藥物或精神科用藥等，具有鎮靜作用，易使人昏睡，因此開車或從事危險工作時應特別小心。

抗過敏藥物及鎮靜劑如和酒吞服，藥效會更強，應避免之。有些作父母的擔心藥物太苦，而加些果汁讓病兒吞服，雖無大礙，不過胃腸不適者常服的制酸劑，就不可以茶或牛奶來吞服，以免破壞藥品在胃中作用的酸鹼值，而影響藥效。

由於制酸劑一般含有鋁和鎂兩種成份，前者易致便秘，後者則易瀉肚子，因此有便秘的人應避免長期服用含鋁的制酸劑，改服含鎂或含鋁量較低的藥物。如果腎臟功能不佳而無法排出鎂，可以改服不含鎂的制酸劑。

留意服藥時間

為了減輕藥物的副作用，更應注意服藥時間和次數。「1天服3次」和「每1小時服1次」的意義就不相同，例如許多藥包上註明飯前或飯後使用，但常有人在吃飯前幾分鐘，才趕著吞顆藥丸，結果藥丸和飯菜進入胃中時間相差無幾。因此病患取藥時應問清楚究竟是空腹服用或隨餐後服用。通常空腹使用者應在進食前後2小時服用；後者可在飯前或飯後10分鐘服用。

抗生素一類藥物對服藥時間控制更為嚴格，因藥物在體內濃度的變化，會影響藥物的作用。近年來醫界發

展出長效型藥物，如持續釋離錠，即藉層層藥物崩解，慢慢釋出藥效，因此藥片不能咬破，以免影響藥效。

又如某些心律不整藥物，如毛地黃，毒性較強，應遵守服藥間隔，如果血中濃度過高，會導致藥物中毒。抗癲癇的藥物也如此，病患應遵守醫囑服藥，否則間隔太近，可能影響中樞神經，出現眼球震顫、牙齦增生等後遺症。另外，制酸劑也不宜和腸衣錠或是治療腸胃潰瘍的藥物併服，且兩者服藥間隔最好在兩小時以上。

老幼用藥須知

幼兒誤食藥物而引起中毒的事件時間所聞，家有幼兒者，應特別注意藥品存放地點，必須放在小孩取不到地方，另外老人的藥箱應隨時檢查，淘汰過期藥物；記憶力較差的老人家，不妨將每日服用的藥品按照周一至周日分配置好，也可避免誤食。

幼兒服藥更應注意藥物反應，因藥物需要經肝臟代謝，但幼兒因中樞神經發育未完全，肝臟酵素分泌不足。相同藥物，成人和幼兒反應不同，如退熱用的肛門栓劑，4小時內不宜連塞兩次，以免引起副作用。

藥物的保存

家中常有些備不時之需的藥物，使用前應注意藥物是否已過期。以心臟病人使用的硝酸甘油片為例，含在舌下時，通常會有燒灼感，但因其中含有硝酸基，極易揮發，如果存放過久，或是未將瓶蓋旋緊，不消數月，藥效即消失大半。一旦心臟病發作，須用來救命時反而喪失生機。因此避免藥物失效，時常翻看藥箱，檢查藥品保存期限是十分重要的。

一般而言，藥物劑型可分針劑、口服、外用三大類，保存期限雖不同，但「避光、避濕、避熱」卻是藥物保存的共同準則。針劑有效期間較短，保存時仍應避免污染；錠劑，只要放置乾冷處，3、5年也不會壞；膠囊雖易為人體吸收，但安定性差，不易保存；含水藥物，如糖漿、溶劑等存放於室溫下，約3天即可能變質，若購買量大，3天無法服完者，最好擺在冰箱冷藏，可使保存期限延長至兩星期。

蜜中上品·零污染·無殘留
基隆特產

中國土蜂蜜

質純細緻 甜味清淡 香氣怡人

春蜜——每瓶 600元
冬蜜——每瓶1200元

大台北地區專人送達
服務專線(02)4517662

太陽谷休閒農園


歡迎租賃授粉。每群2000元。亦可售



簡易植物養分檢定器
Plant nutrient test kit

分析植物之葉或莖，判定其成份含有量所需的器具與試藥組裝，在現地使用便利的檢定器。
重量約2.9kg

檢定成份：
硝酸態氮、
磷酸、鉀、
鈣、鎂



友玉企業股份有限公司 新營郵政120號
電話(06)6322511 FAX (06)6325811
郵政劃撥03228866 友玉企業股份有限公司帳戶