



台南2號田間結莢數多又飽滿



台南2號較對照種高雄選10號提早4

→ 耕後期的灌排水工作。

夏作栽培方式，考慮到播種期及生育期間正臨雨季，若排水不良，容易造成過度潮濕影響種子發芽不良及生長阻礙，因此，夏作栽培須採整地高畦式或半整地作畦栽培，方便多雨季節的排水效果。

5. 除草

大豆播種後為防治雜草滋生，應即全面噴施殺草劑，萌前殺草劑以34%施得圃乳劑或45.1%拉草乳劑稀釋300倍，均勻噴施於土壤表面，每公頃施藥量3~4.5公升，雨季

來臨前則避免使用以免傷害豆子發芽。生育期中有禾本科雜草或前作幼苗3~6葉時，可以使用17.5%伏寄普乳劑稀釋600倍，每公頃藥量1公升來防治。

6. 肥料

春作每公頃化學肥料使用量，硫酸銨200公斤，過磷酸鈣300~400公斤，氯化鉀約100公斤；夏作硫酸銨50~100公斤，過磷酸鈣及氯化鉀則照春作用量。三種化學肥料都作基肥，於播種前均勻撒施田間，再行整地播種。

肥效長久 後勁十足

肥料登記證：北進質字10501號

泰 國

T.C.O.

請認明商標

原裝進口 歷史悠久

土壤改良

最佳有機質肥料

最純正

泰國蓖麻粕

含有成分：

氮	5.5%
鉀	1%
磷	2%
有機物	65%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、婆羅、花卉、竹筍、中藥。

泰國蓖麻油工業公司出品

台灣總代理 泰坦企業股份有限公司

(02)7044259

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社