

小黃瓜生病了，怎麼辦？

問 1.本人每次種植小黃瓜及菜豆，皆自基部葉片患病，一直蔓延至心部，甚至枯死，而數株較不嚴重者，則果實短小尖型且彎曲。

2.菜豆心部葉片不伸展且蔓延基部葉片，不結豆夾，如有結夾者，甚小且短，彎曲，甚至連豆株枯死。

3.曾用大生及好年冬噴菜治療，但皆無效。敬祈賜教如何處理。

4.小黃瓜是否也要摘芽？其時期如何？

(樹林鎮王華定)

答 1.小黃瓜自基部葉片患病，以露菌病最普遍，往往大部份葉片枯死，則因無葉片行光合作用，沒有營養而瓜果必變短小或呈尖型、彎曲等。防治本病應自栽培之初即於地面蓋稻草或塑膠布，以防土面上之病菌因雨水等之飛濺而感染到葉片。噴藥防治則應噴及葉片背(下)面，藥劑可使用55%脞硫醃銅可濕性粉劑500倍或64%甲鋅敵殺斯可濕性粉劑400倍，上述藥劑均於施藥後7天才可採收。另菜豆自老葉開始患病，可能是「銹病」為害所致，可使用30%三得寧乳劑1000倍，噴藥後4天可採收，每週噴1次。但上述兩病害，最好在尚未結果或結豆之前即應施藥預防之，則效果較佳。

2.菜豆自心部葉片皺縮伸展不開，很可

能是毒素病引起，本省菜豆絕大部份已感染毒素病，因此最好不要自行留種，因本病會隨種子傳播感染，可與台中種苗繁殖場洽購健康種子種植。另蚜虫亦是傳播本病之媒介昆虫，平時應注意防治蚜虫。

3.大生及好年冬均屬劇毒農藥，最好不要使用於蔬菜類，尤其小胡瓜及菜豆等不定期採收之蔬菜，更應注意農藥之安全使用。

4.小黃瓜搭架栽培者甚少有摘心者，但地際處分芽太多則應及早摘除，以免損耗養分。

(桃園區農改場台北分場 杜德一)

財團法人台灣區種豬發展基金會 82年度第二次 種豬比賽 展示拍賣會

時間：中華民國82年9月9日上午8時至下午5時

地點：白河種豬改良聯誼會
(台南縣白河鎮中山路2之136號)

比賽及展覽項目：

一、各品種優良種豬比賽展示 二、優良種豬拍賣交流
三、畜牧藥品、器材展示

主辦機關／財團法人台灣區種豬發展基金會

協辦單位／白河種豬改良聯誼會

輔導補助機關／行政院農業委員會 美國飼料殺物協會(USFGC)

台灣省政府農林廳 台灣區雜種發展基金會

台灣省畜產試驗所 台灣區肉品發展基金會

台灣養豬科學研究所 台灣省農會

各縣市政府 台灣省養豬生產合作社

美國黃豆協會(ASA) 各縣市農會



歡迎養豬業者蒞臨參觀