

5.減少雜草的發生

混合栽植的草可以和雜草競爭，所以就減低雜草的發芽，當然也就減少殺草劑的噴灑。

注意事項

在選擇混合栽植的草種時，必須防範幾個要點，如顏色、質地粗細、生長習性等不是類似。例如麗糠穗草為淺綠色，而肯德基藍草色較深，若這2種混合栽種，會有出現斑點草皮的感覺。另外也要注意選擇Over-seeding的草種時，生長勢不可強於原本的草種。

在混合栽植的歷史中，耐寒性品種中經常用來混合使用的，而且混合兩種以上的草種是很普遍的。相對的，耐熱性品種由於生長侵略性太強，所以大多只利用單一品種來種植，也就因為這種生長習性的差異，混合栽植的耐熱性和耐寒性草皮品種經常有問題出現，而這又是本省所迫切需要的。追述草皮混合栽植的研究歷史，在1950年南加州的報告認為長牛毛草和巴哈草（bahiagrass）的混合栽植生長良好。1980在密西根州的一篇報告指出肯德基藍草可以和百慕達草混合栽植良好。1993年北卡羅南納州的一篇報告中利用10種不同品種的肯德基藍草和百慕達草混合栽植3年後發現，肯德基藍草品種中，“Georgetown”和百慕達草的混合栽植其品質除了7月以外，比起百慕達草單獨種植來的好。“Kenblue”品種和百慕達草混合栽植其品質在春、冬2季也比百慕達單獨種植好。混合栽種“Georgetown”“Keublu”和百慕達的草地其雜草出現率只有12~26%，但單獨栽植百慕達草的草地，雜草出現率達50%。

總之，在試用混合栽植時，得記住幾項原則：

1.選擇抗病或抗環境不良的草種做為混合栽

表1.不同的草種組合，生長在不同環境下的狀況：

混合栽植草種	生長環境	生長勢較強的草
百慕達草+聖奧古斯汀草	遮蔭	聖奧古斯汀草
百慕達草+聖奧古斯汀草	割草高度10吋	百慕達草
百慕達草+蜈蚣草	遮蔭	蜈蚣草
朝鮮草+蜈蚣草	過度使用	朝鮮草
肯德基藍草+細牛毛草	遮蔭	細牛毛草
肯德基藍草+細牛毛草	高氮肥量	肯德基藍草
肯德基藍草+長牛毛草	割草高度1.5吋	肯德基藍草

植時，先對當地經常出現的病害或氣候行為調查清楚。

2.確定所選的品種是很相近的，不可以有不協調的感覺，也不可以互相侵害。

3.使用blend的混合栽植時，選擇至少3個品種以上。

來自大海

無抗生素、無雜菌污染
之最佳海洋動物性有機質營養添加物

● 魚精(魚溶漿) 220kg

登記證字號：
台省農畜飼製字第18124號

保證成份：
粗蛋白質27%以上
粗脂肪15%以下
粗灰份10%以下
水份45%以下
揮發性塩基態氮10%以下
塩酸不溶物1%以下

● 魚粉 40kg

登記證字號：
台省農畜飼製字第18123號

保證成份：
粗蛋白質50%以上
磷 2.2%以上
粗脂肪12%以下
粗灰份26%以下
塩分3%以下
水份12%以下
塩酸不溶物2%以下

● 龍蝦精 10kg

● 蟹殼粉 25kg

● 墨賊精 220kg

總代理：**嘉盟企業股份有限公司**
台中市大里鄉東興路518號 04-2624711 施先生 090421826