

開花期灌水後，增施氮肥30%用量。追肥時應避免露水未乾前施用，以免葉片受肥料之傷害。

除草

紅豆播種後為防治雜草孳生，旱田整地栽培，於播種覆土後應立即全面噴施萌芽前殺草劑，以34%施得圃乳劑300倍液，均勻噴施土壤表面。稻田不整地栽培，於播種覆蓋稻草後立即噴以34%施得圃乳劑稀釋300倍再加24%巴拉刈液200倍液均勻混合後全面噴施，於稻草及稻株頭上作為萌芽前雜草防治。生育期中約播種後20天，如有禾本科雜草3~5葉時，則使用17.5%伏寄普（萬帥）乳劑600倍液噴施加以防除。但施用殺草之前須注意氣候，如遇天氣不良，下雨來臨前則避免使用以發生藥害。

灌排水

紅豆生育期間土壤過乾或過濕均非所宜，因此旱田栽培紅豆者應行整地作畦栽培，稻田不整地亦須開溝栽培以利灌排水。播種時田間須保持適當濕度，生育期間視田間乾濕情形酌予排水，於始花期及幼莢形成期需水量最多，必須充分給予水份，但灌水量亦不宜過多，以畦面吸濕潤即可，在下雨時應特別注意排水工作。

病虫害防治

1. 病害

紅豆主要病害有根腐病（白絹病、苗根腐病、苗立枯病）、白粉病、銹病等。預防根腐病須改善田間排水，不可施用過量之氮肥及連作。於發病初期或發芽後，使用75%滅普寧或50%福多寧可濕性粉劑，每公頃施用1公斤稀釋2000液任選一種，以灌注方式噴注於植株基部。白粉病發生於生育中後期可用25%布瑞莫乳劑3000倍液，或11.76%芬瑞莫乳劑4000倍液，或25%依瑞莫水懸粉1500倍液任選一種防治。銹病施用80%鋅錳乃浦可濕性粉劑400倍液或5%三泰芬可濕性粉劑600倍液任選一種防治之。

2. 虫害




紅豆播種時為預防潛蠅類、蚜虫、紅蜘蛛及切根虫等可在整地播種前，於基肥中混合3%加保扶粒劑每公頃用藥量40公斤，均勻撒施於土面，然後再行整地播種。發芽後特別注意根、莖潛蠅防治，由於發芽後至生育初期被害情形甚為嚴重，根潛蠅被害後根際部稍為膨大呈褐色裂痕，被害植株因營養及水分輸送受阻礙，嚴重時整株枯萎或枯死，應於發芽後3~4天，即以55%亞素靈液或45%一品松乳劑1000倍液任選一種防治2~3次，並可與白絹病防治藥劑混合後立即使用。生育期與開花結莢期發生潛蠅類，薊馬、蚜虫、紅蜘蛛、夜盜虫、甜菜夜蛾、螟蛾等



瑞典 好速耐

機械總匯

農林·園藝·割草·綠化

背負式割草機

引擎鏈鋸

引擎剪枝機






中耕管理機

剪定鋏

修枝剪

割草安全配件

上江實業有限公司

桃園縣大溪鎮得勝路5號 TEL: (03)3883444

桃園市復興路42號 TEL: (03)3326408

台北市民權西路127號5F TEL: (02)5970023

台中市青島路一段26之5號 TEL: (04)2976080