

成株，北自台北縣之北插天山，新竹縣竹東，苗栗縣南庄、大湖，台中縣武陵農場、青山、谷關、白冷，南投縣仁愛鄉蘆山、溪頭，嘉義縣吳鳳鄉，南至高雄縣旗山、扇平、阿卑線，屏東縣霧台、來義，潮州萬金庄、南仁山，東至台東縣中央山脈山水坡、金山、太麻里、關山而至花蓮縣玉里、鳳林、太魯閣等陰濕森林內都可見其踪跡。

1. 光線

金線蓮喜弱光，約 $\frac{1}{3}$ 陽光(3,000~5,000 LUX)之光度最爲適宜，光線太強或太弱均會影響植株生育。

2. 溫度

金線蓮屬高山植物，性喜冷涼氣候，在25°C以上之氣溫下，生長停頓甚至枯萎，5°C以下也生長不良，最適宜的溫度是15~20°C。

3. 濕度

金線蓮爲地生蘭之一種，喜濕潤，最適宜之相對濕度爲75~85%，但需通風良好之環境。

4. 土壤

天然生長之金線蓮多半生長於潤葉樹林下，有極厚的腐植土，排水良好，有機質豐富，且呈微酸性之土壤，pH值在5~6之間，最適宜生長。

°C時，夏季不需冷氣機，則可降低生產成本。

2. 栽培場設施

(1)遮陰網：栽培場地須通風良好，設置防雨網室，遮阻三分之二的陽光。以塑膠或玻璃作防雨屋頂，高約2.5~3公尺，屋頂上下1公尺處各搭一層遮陰網，上面之遮陰網爲固定式，除遮陰外，主要用於降低栽培場之溫度，下面之遮陰則爲活動式，可在冬天或陰天時拉開，以機動調節光線強度。網室的四週，東西二面可視情況，架設1~2層黑網，南北向則可設一面網或不設網，依栽培場所之採光情形而定。室內嚴防蝸牛、蛞蝓、蟑螂、鳥類及蛇類之侵入。尤其大蝸牛，可能在一夜之間，吞噬大量植株，造成極大的損失。

(2)植栽床：爲減少蝸牛及蟑螂爲害，栽植床儘可能不接觸地面。可採用階梯式或水平式。架設材料選用竹、木或鐵材，高度80公分。栽培床如果用籃子則在底部用塑膠網或報紙支持栽植材料，塑膠籃高約15公分，裝填10~12公分高的植材，如此分籃栽培，有利於夏季控制病害之傳播。栽培場地若爲平地，可在地面挖淺溝，或以磚塊圍成淺水槽，上覆塑膠布，然後貯水於塑膠布內，以提高栽培場之空氣濕度，並注意保持通風良好。

(3)栽植材料：金蓮雖喜潮濕，但根部最忌水份過多，栽培介質必須排水良好。所有的植材在栽培前宜置於太陽下曝曬數日，進行消毒殺菌，一般選用長度0.3~0.5公分蛇木屑作爲介質材料，添加 $\frac{1}{5}$ ~ $\frac{1}{4}$ 的碳化稻殼，腐植土，以供給有機及微量養份，上面鋪一層細水苔可減少水份之蒸發。

栽培方法及步驟

(1)馴化：組織培養之幼苗移植前須經馴化，將瓶子置於栽培場中7天或更久，切勿打開瓶蓋，使瓶苗先適應栽培場之光線和溫

廠美原裝進口

掘溝機

售價：15萬元

馬力：3.5HP或5HP 掘寬：7.62cm
特性：長、短臂任選 掘深：24"或36"
採用硬化鋼牙
節省時間、重量輕、可攜帶
減低地面受損面積
適合：埋設管線、電線、挖溝、施肥
移植苗木、建築物

座騎式割草機 誠徵

售價：55,000元

馬力：8HP 刀長：24"
特性：安全離合器踏板
割草高度可調整
電動起動
曳引機座椅
可附掛施肥車、施肥、噴藥

健勇企業有限公司

台北縣蘆洲鄉永興街93號
電話：2853824~5 / 傳真：2853827