

以黃豆餅充分浸水使之完全發酵後，取澄清液經適當稀釋，於早上澆水後，噴施於栽培圃上，供根吸收利用，施肥後不立即澆水，以利肥份吸收，施肥次數應視生長情形而定，每月1~2次為宜。

病虫害防治

1. 猝倒病

其病徵為幼苗期或成株之莖基部受感染後，初期呈黃褐色，漸變為黑褐色，最後感染部位脫水縮水，植株倒伏，故謂猝倒病。此係由鐮刀菌及疫病菌所引起，其中以鐮刀菌較為重要，其孢子藉土壤及水份傳播，在高溫(28~32°C)下，病害傳染迅速，為平地夏季栽培之最主要限制因子；由疫病菌引起之病害則於冷涼氣候下較易發生，但發病程度不若由鐮刀菌引起者嚴重。防治本病須採用清潔之栽培介質，在種植前須先將介質消

毒完全，於溫、濕度偏高時在栽培圃中，噴施克露或鋅錳類之藥液，並避免在高溫的地方種植，若發現病株應及時拔除，且用地特菌2,000倍液噴灑，嚴重時應更換栽培介質。於傍晚噴藥之同時噴施無機葉肥，則肥份吸收及病菌防治效果更佳。

2. 細菌性軟腐病

植株呈軟腐現象，此病由噴灑水傳播，感病時除整籃移走外，可用美谷丹1,000倍防治。

3. 蛭蟪、蝸牛

喜食金線蓮，於栽培場之地面上放置聚乙醛粒劑防治之。


4. 鳥害

鳥類喜食金線蓮，故又名鳥參，栽培場宜以鳥網圍之，預防鳥類侵入。

5. 紅蜘蛛或蟎類

為害後，葉片呈白褐色，葉背佈滿體積

MA-200 日本原裝單軌搬運車



用途：採收、施肥、澆水、巡視山園。

- 特點：
1. 搬運速度快、性能安全、機動性高
 2. 急傾斜山坡地形使用，效率一級棒。
 3. 節省人力、工資，精緻農業必備。
 4. 操作簡便，保養容易，經濟效益大。
 5. 施工時不會破壞地面，可確保水土保持。
 6. 風雨中照常使用，行駛時平穩不傷果皮。
 7. 果園、林場、工地、工廠等場合適用。

台灣總代理：亞來股份有限公司

台北市羅斯福路三段240巷14號4F
電話：(02)3687932~3 FAX：(02)3672143
東勢營業所(04)5872789 梨山營業所(04)5981554
桃園倉庫(03)4701455 信義營業所(049)791575