

→ 1.紅壤


發育時間久遠，土壤鹽基嚴重流失，pH 值及鹽基飽和度均低，鐵鋁含量相對增加，土壤構造極佳，但有效水分之保持力不佳。本類土壤分布面積僅有46.12平方公里，佔總調查面積之2.22%，分布於鹿野、初鹿等台地及緩坡丘陵安定的地區，但因母質及形成年代的不同，在性質上則多少有些差異。本區紅壤之表土有機物含量視土地利用及植生覆蓋之不同而有很大的差異，一般多在2%左右；土壤 pH 值仍偏酸，以洪積層母質、板岩母質所生成之紅壤 pH 值最低，多屬極強酸性（4.5~5.0），次為火成岩紅壤，pH 值多屬強酸性（5.1~5.5），而以片岩紅壤及火山島所生成之紅壤 pH 值最高，可能係因母質中多少含有石灰成分，淋溶未盡。蘭嶼、綠島之紅壤有具微鹼性者，此係因受海風帶來海水，及礁石之影響，此乃外力、外物所致之變異，因面積有限，且其

他性質相差不多，故仍歸入火成岩紅壤。至於土壤之陽離子交換能量仍多偏低，大多在10m.e./100g 以下，惟火成岩母質之紅壤，其陽離子交換能量則較高，多在30m.e./100g 以上。

2.黃壤

亦為本縣較老的土壤，因生成年代早，受氣候之影響較大，淋溶較深，質地多粘重且缺少養分，以分布於坡度較緩，地形安定之丘陵地區為主，面積約有106.30平方公里，佔調查面積的5.12%，面積不大。分布於海岸山脈卑南、成功、泰源至花蓮富里之山谷、關山鎮及池上鄉海岸山脈西側之緩丘陵等地區，主要係由砂頁岩或泥岩化育而成，土層較深而粘重；而分布於中央山脈區大武、太麻里、達仁、海端及中央山脈谷邊麓坡如台東市豐里、卑南之下檳榔一帶有零星分佈，屬粘板岩質之黃壤，質地變異較大，土層多淺。


日本岡恒牌高級園藝工具



近正






M-100R
柑仔剪(彎型)



B-300SP
葡萄剪

加馬喜



高枝剪定鋏 高枝採收鋏 二M·三M

經銷處：新高貿易股份有限公司

台北市峨嵋街68號 ● TEL: (02) 3314190

郵撥儲金台北市0015195-5 FAX: (02) 3613573

請認明 A 級標幟，
以免買到仿冒品