



穗變黃下垂且緊密時，即達成熟期，可採收

→ 2.紋枯病：〔病原菌：Pseudomonas setariae (Okabe) Savulescu〕

(1)病徵：初期在葉鞘上形成橢圓形、灰綠色水浸狀病斑，而後逐漸擴大變成中間灰白色，邊緣褐色，有時數個病斑癒合成虎斑狀。葉部受害時初呈水浸狀，環境適合時迅速擴大形成雲紋狀或不正形之大病斑，後來病斑或菌絲附近之表面產生暗褐色菌核，該

菌核遺落田間為下期作之感染源。

(2)防治方法：請洽區農業改良場植物保護人員指導。

3.夜盜虫：〔Leucania separata (Walker)〕

(1)為害情形：1~2齡幼虫不分晝夜群棲於心葉部，取食嫩葉，造成心葉枯黃。3~4齡晝間潛伏於心葉部，至黃昏後，開始活動並移行至葉片上，自葉緣嚙食，使葉片失去光合作用能力，影響產量及品質甚鉅。

(2)防治方法：請洽區農業改良場植物保護人員指導。

4.螟虫：〔Chilo traea infuscatellus (sn.)〕

(1)為害情形：幼虫潛入葉鞘內危害造成側葉枯黃，再蛀入莖內危害，形成枯心，孕穗期以後蛀入莖內時則造成白穗。

(2)防治方法：請洽區農業改良場植物保護人員指導。

5.潛葉金花虫：〔Sphaeroderma apicale Baly〕

最新專利庭木移植栽植袋——美植袋

美植袋

新型專利第74180號

(樣品及資料備索)



美植袋移植情形



移植後生長情形



根系生長情形

栽植特點：

1. 小苗直接栽植成樹只需切斷袋外細根就可移植節省人力。
2. 任何土質皆可使用，擴大適種地區。
3. 快速成長及移植困難樹種，最適宜使用。
4. 移植時土球較傳統栽培者小，節省搬運成本。
5. 大部份根系生長袋內，移植品質大幅提高。
6. 和其他容器栽植比較美植袋成本最低，成長最快。

移植特點：

1. 大部份根系留存袋內，周年皆可施行移植。
2. 可當包裝容器，節省包裝成本。
3. 移植時可保留大部份枝葉樹型品質大幅提高。
4. 提高成活率，節省大筆保養維護費用。
5. 對於有移植障礙樹種，特別有利。
6. 較其他容器，移植成本低，效果佳。

經
銷
處

台北區

王量園藝有限公司

台北市文林北路153號

TEL/(02)8236171
8237248

台中區

七巧園藝事業有限公司

豐崎鄉中正路124巷17弄1號

TEL/(04)8308917
3395967

彰化區

瑞豐園藝

田尾鄉義平村中山路一段540號

TEL/(04)8830956

高雄區

園景綠化工程有限公司

美濃鎮五谷街35號

TEL/(07)6833555

屏東區

藝精園藝

麟蹄鄉堤北村豐年路2-10號

TEL/(08)7935770