

治療

在靜脈栓塞治療前最好做個詳細的檢查，以確定栓塞的部位或者是否屬家族性的疾病。大致上而言，靜脈栓塞早期發現，應用口服藥物，即能做好病情的預防及控制。

一旦發現腿部有腫脹或顏色不太對勁時，可能處於腿部深處靜脈栓塞的急性期，就得儘快送醫，若經診斷確定，在發生的1小時內服用溶解血栓的藥物，便可使血塊完全溶解；若送醫遲了些，可服用一些藥物，防止血塊繼續的惡化、擴大，且在送醫途中或在家修養時，也要儘量躺臥著，避免走動，因為栓塞可能會經走動後，經由心臟至肺部。

如果不屬於家族遺傳性的靜脈栓塞病人，服用口服藥物2~3個月後即可停止，若是家族遺傳性的病人，就得終生服用藥物，且須經血液科醫師給予；因為服用的藥物劑量要經常調整，過多過少都可能引發問題，過多會有血栓，過多則血液不易凝固且有出血現象。

另外，栓塞的原因若是因服用避孕藥物，則需要看是不是因病人體質並不適合服用避孕藥所導致的，而紅斑性狼瘡或腎臟病的病人也

有靜脈栓塞現象時，就要針對疾病本身做好治療，以免血栓再度發生。

如果已經有嚴重潰爛現象時，病人也絕不可以私自擦用藥物，以免發炎更嚴重，形成敗血症。若極為嚴重，可找外科醫師，做靜脈結紮後再切除的手術，這樣對外觀美容上有相當的效果。

腳部的靜脈栓塞預後情形不錯者，在出院以後還是要和醫師保持聯繫，做密切的追蹤，並且聽從醫師的指示定期服用藥物，而少數栓塞已達肺部的病患，經急性處理後，也要服用藥物做好預防工作。


就靜脈栓塞的原因來看，較易罹患的人平時多小心注意，也就能減少栓塞的情形發生了。

許多婦女很關心的腳部靜脈曲張，這大多屬於良性的，雖然外表上並不好看，而腳部的酸疼腫脹也很難受，但若穿了彈性襪後，症狀都可以改善許多。在家休息、睡覺時，也最好抬高腳部，有助於靜脈的回流，改善症狀。






灌溉噴霧 噴頭總匯



請將
灌溉、噴灑：
茶園、果園、苗圃
，洗車、園藝造景
的利器全交給——
創廠於1975年，迄今
擁有15年外銷實績、
專業製造高品質的——



嶸利企業股份有限公司

彰化市安溪里安溪莊2-1號
電話：(04) 7384311 (代表號)
傳真：(04) 7385198

誠徵——各地經銷商 詳洽——內銷課蔡小姐