

82年後龍鎮秋作洋香瓜
觀摩品嚐情形



Spergon) 可濕性粉劑拌種，使用藥量為種子之 $3/1000$ ，兩者放入容器內充分混合，如在春作低溫時催芽，將浸種消毒之種子，放置於 $28\sim30^{\circ}\text{C}$ 簡易保溫箱內 $1\sim2$ 天，有白色之根冠露出時即可播種，播種用穴盤育苗或塑膠鉢，播種後需充分澆水，使濕透為止。

5. 育苗管理

春作播種後放置於簡易塑膠布網室內或較避風處，用隧道式防寒，夏作或秋作可用尼龍網之隧道式防雨，並在放置育苗之週邊，撒佈加保扶粒劑或賽滅得粒劑，以防鼠害，並視情形於早晚各澆水一次，至 $3\sim4$ 葉即可種植。

6. 栽植密度

每一大畦($2\sim2.5$ 公尺)種一行，以種畦中央較易引蔓，株距 $40\sim50$ 公分， 10 公畝約可種 800 株左右。

7. 覆蓋銀灰色塑膠布與固定網

做畦與基肥施用後在種植前畦面覆蓋寬 1.2 公尺或 1.5 公尺，長以田區長度為取材，銀灰色塑膠布以防雜草及保持水分，同時加上固定網以便引蔓時固蔓作用。

8. 施肥量

洋香瓜根群成而纖弱，且生育期短，故必需施用基肥。 10 公畝之施用量，有機 $200\sim300$ 公斤，複合肥料 1 號 $80\sim100$ 公斤，另



嶸利企業股份有限公司

彰化市安溪里安溪莊2-1號

電 話：(04)7384311(代表號)

傳 真：(04)7385198

誠徵—各地經銷商 詳洽—內銷課蔡小姐