

→ 至成熟採收，如此可防瓜實蠅又可防季節風和豪雨一舉數得，每分地之材料費約8,000~12,000元。

## 灌溉與排水

北部地區種植洋香瓜，春作有梅雨，秋作偶而遇上豪雨，瓜園之環溝與畦溝都需要做好，下雨時以利排水，乾旱時又方便灌水，洋香瓜除久旱不雨時，最好不要經常灌水，灌水過多時，植株會太過茂盛，結果因而不良，且易生病虫害，和減低甜度，只有在生育初期和小果期略加灌水，灌水時以溝灌為宜，只要畦溝6~7分滿，稍加灌透後加以排水，灌水時以夜晚為宜，最忌中午灌水。

病虫害防治

瓜類之病蟲害防治，蟲害較易防治，一旦發現有蟲用一般之殺蟲劑噴施即可，但病

害則不同，發病後往往會整區枯死，所以採定期預防勝於治療，普通正常之天候以7~10天施藥一次，如遇陰雨綿綿，待雨過天晴必需施藥，茲將瓜類防治藥劑介紹如43頁

## 採收與分級包裝

## 1. 採收

洋香瓜採收期甚為重要，太早採收糖分不高，影響品質，過熟瓜蒂脫落，失去商品價值；應視其網紋，果皮顏色，加以辨認，種植期氣溫不同，大致以結果後30~35天則可收穫，初次種植者最好請教有經驗者，以提高品質。

## 2. 分級包裝

收後必需行分級包裝、特、優、良分開，並以紙箱包裝以減少損傷，以2粒、6粒、12粒裝以便出售。