



水稻水象鼻蟲成蟲 (為害水稻葉片)



(上) 水稻被害狀 (對照) (下) 施用好年冬3%粒劑



水稻水象鼻蟲幼蟲 (為害水稻根部)



(左) 水稻被害狀 (對照) (右) 施用好年冬3%粒劑



三度蟬聯金字招牌獎

好年冬[®]

Furadan[®]
根群保護
3%粒劑

唯一獲得試驗推薦
防治水稻水象鼻蟲藥劑

政府推廣之使用方法及適用範圍：

	使用範圍	用藥量	使用方法(每公頃每次用藥量)及注意事項
水稻	水稻水象鼻蟲	60公斤 / 公頃	1. 水稻生育初期,成蟲每叢平均0.5隻以上時施藥一次。 2. 施藥時,稻田需保持水位約一公分。
水育 苗 稻箱	水稻水象鼻蟲	50公克 / 每育苗箱	1. 於機械插秧前24小時內,將藥劑均勻撒佈於育苗箱,撒佈後用木棒輕掃,使藥劑落於上面,然後再少量澆水(應避免水流出)以免藥劑掉落或飛散。 2. 插秧後,水田水位保持2~3公分,為期4~5天。 3. 育苗箱使用。

農藥廢容器清洗及回收方法,詳請參閱標籤及仿單(說明書)。



大勝

化學工業股份有限公司

公司地址：台北市松江路182號10樓

電話：(02)5628971~4

工廠地址：雲林縣莿桐鄉莿桐村農校路3號

電話：(05)5842450



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
台北市中山北路2段112號805室

美國製造廠：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division