

→ 以杜絕轉移寄生，減少受害機會。另清除並燒燬地面枯枝、落果及落葉等，或噴藥時對地面落果及落葉一併處理，可減少虫源。

2.1~6月間於果園懸掛性費洛蒙誘虫盒，定期計數誘捕細蛾虫數，明瞭細蛾發生消長，以供防治參考。在正常年藥劑防治適期為荔枝花落結小果後20~25日左右（中部約在4月30日）；如遇冬季溫暖少雨時，細蛾較易猖獗，可於荔枝花落結小果後（中部約在4月20日），立即施藥防治細蛾產卵危害。

3.荔枝與龍眼開花期勿施藥，以免影響蜜蜂授粉。早期可用藥性較強的加保扶水懸粉，後期改為芬殺松或撲滅松乳劑，每7~10日施藥一次，採收前10日停止施藥。將來第滅寧及賽滅寧二種藥劑經政府正式推薦後，果農選用藥劑種類會更多。另施藥防治時採行共同防治，並對果樹枝、葉、果實全面

噴灑，將可增加防治效果。

4.最近政府推動擴展荔枝外銷市場，且實施病虫害檢疫及抽驗農藥殘留之規定，因此，果農應加強細蛾防治工作，並注意農藥安全使用及嚴守安全採收期之規定，嚴禁使用劇毒且長效的巴拉松、大利農及大克蟪等非推薦藥劑，以免因農藥殘留超過規定，影響果品信譽及消費者健康。



## 笑一笑

### 喜見同道

精神病院的病人對新來的王醫生說：

「王大夫，我們都很喜歡你，你比以前那位大夫好多了。」

王醫生：「謝謝你們，到底是為什麼呢？」病患：「因為你看上去和我們病人的樣子差不多。」


歡迎投稿

# 美國 CONWED® 康威防鳥網

◎美國原裝進口，質輕、強韌，網目均勻成型，遮光率2%以下，覆蓋容易。

◎高經濟水果、水蜜桃、蓮霧、甜柿、草莓、棗子、葡萄及養殖場魚、蝦、花跳……，防患鳥害、投資低、回收快、品質提高。


新配方



規格：OV-1674

網目：17×19mm 寬度：4.27

拉力表：  
單位：牛頓/10公分



OV-1674

縱 橫

146×152

OV-1670

縱 橫

140×134

玉和實業股份有限公司

台北市文山區保儀路109巷3弄34號

TEL:(02)9385066~8 FAX:(02)9385018