



腹鉤薊馬成蟲

辨認。

成虫雌者體長1.37公厘，體呈暗褐色，足及觸角黃色，翅為縷狀，黃色，雄者體長1.08公厘，胸節暗褐色，腹節黃褐色，在第四腹節側方各俱一齒狀突起，故名之「腹鉤薊馬」

分布取決植物體生長因素

本虫於成虫期較為活潑，移動範圍較

大，若虫初孵化時通常成聚集性，移動較為緩慢。

由產卵行為觀之，成虫通常移行至嫩葉，雌雄交配後即開始產卵，一般產於幼葉之葉肉間，肉眼無法看到，待數日卵孵化後，葉片也逐漸轉成中、老葉，所以本虫之分佈大部份取決於植物體生長因素。

比較成虫與幼虫分布植株葉片情形，成虫分布於嫩葉及老葉較多，而若虫大部份分布於中老葉。

8、9月是危害高峰期

本虫於田間之消長因地、寄主種類而相異，其中檬果上發生由5月開始，至8、9月達高峰，10月以後受低溫影響，密度因而下降，而蓮霧園其密度由5月份開始

作物需要好土壤 土壤需要黑綠旺

農大黑綠旺

保證成分：全氮 4%·全磷酐3.1%·全氧化鉀2%

肥料登記證：臺製質字03101號

創造了有機質農業的奇蹟

黑綠旺採用大宗物質，經微生物發酵充分腐熟後，添加胺基酸、磷、鉀、鎂、鈣、微量元素等調配而成，含蛋白質、纖維、腐植酸、乾基達45%以上，是營養元素最齊全的有機綜合肥料。

特色

- 專業技術研製，具保水、保肥、耐寒抗旱等多層效益。
- 針對各類作物特性與需要，調配有16種號別系列產品，功效獨特。
- 鬆土效果佳，肥力強，作物生長好，增產達二成以上。
- 推廣數年來獲得農民好評與肯定。



農大產業股份有限公司

高雄縣路竹鄉甲南村大仁路520巷7-1號

電話：(07) 6972259~61

夜間(07) 6961071

傳真：(07) 6972263

經銷點：全省各有關鄉鎮農會