

大量發生，到11月份虫數下降，其發生與溫度、雨量有關，尤其溫度因子之影響甚於雨量因子。

3 項防治要點

本虫體小，早期發生常被忽略，故防治本虫要點有三，一為了解該虫生態，預測該虫之發生，做好田間觀察工作，並把握經濟防治，二為悉熟該虫生理狀況，包括薊馬口器、吸食方式及部位，三為對症下藥，包括薊馬鑑定及防治方法之選定。

藥劑防治可任選下列一種，3%亞滅寧乳劑（1000倍）、2.8%賽洛寧乳劑（2000倍）或2.8%第滅寧乳劑（1500倍）於該虫發生時，每隔7~14天施藥一次，連續1~2次，採收前6天停止施藥。



腹鉤薊馬小檔案

學名：*Rhipiphorothrips cruentatus* Hood.

英名：Grape-vine thrips




分類：昆虫綱、縷翅目、錐尾亞目、薊馬科、網薊馬亞科

寄主種類：葡萄、番石榴、芒果、蓮霧、釋迦、楊桃、檸檬、葡萄柚、椪柑、甜橙、柿、龍眼、蕃茄、荔枝、梨。

分布：台灣、中國大陸、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、阿富汗。

銀色遮光隔熱網

- 遮熱(保冷)佳，熱能反射，不吸熱，降溫效果最佳。(降溫2℃~7℃)
- 遮光率25~75%多種規格，適合各種作物。
- 隧道式栽培亦適用。
- 防紫外線處理，使用壽命長。



F.R.P. 強化玻璃纖維支柱

- 復元性100%。
- 不生鏽。
- 重量輕。
- 安裝收藏容易。



防草不織布

- 透氣透水，土壤活化。
- 防止雜草發生。
- 抑制土壤水份蒸發。

東宇貿易股份有限公司 | 北市南港區興南街23號3F
TEL: (02) 7884376-8, FAX: (02) 7883677