



菜嘉多[®] (蘇力菌)

3.8%可濕性粉劑

◎全新的包裝
 展現汽巴對社會、環境
 經濟三方面的責任與承諾。



黃圓圈是陽光
 淡藍曲線是水
 背景藍是空氣
 綠色的葉子是植物



◎第二代蘇力菌



由庫斯塔基亞種與鮎澤亞種
 二菌株經由細胞接合生殖而
 產生的新菌株。兼具親代的
 毒蛋白質，有更廣效的殺蟲
 效果。

新生物性殺蟲劑—經濟；低毒

實驗推薦使用方法及適用範圍：

作物	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數	使用範圍	施藥時期 及次數	注意事項
甘藍	0.8~1.0 公斤	1000	小菜蛾	小菜蛾發生時開始施藥 ，每隔7天施藥一次。	廢容器清洗及回收方法，詳 請參閱標籤及仿單(說明書)

請填妥您的資料，寄回汽巴嘉
 基植物保護部，即可收到產品
 資訊及“汽巴十字花科蔬菜綜
 合蟲害防治方法”手冊。



台灣汽巴嘉基股份有限公司

台北市仁愛路二段99號11樓 電話：(02) 3416580

總經銷：



德泰有限公司

台南縣新營市中正路100號 電話：(06) 6353326

※誠徵批、竹、苗地區經銷商

姓名：_____

地址：_____

電話：_____

傳真：_____

種植作物：_____

種植面積：_____

出生日期：_____

給汽巴的建議：_____
