


# 使用扦插法種葡萄，如何發根？

**問** 新植葡萄園，以扦插法種植時，發根劑何處可買得到？（宜蘭南澳鄉明映輝）

**答** 1. 有關葡萄扦插發根劑，在修枝後以0.5%吲哚丁酸粉劑塗佈或0.4%吲哚丁酸溶液（IBA）2~5倍浸漬20秒後插枝。

2. 一般在剪枝放入冷藏庫（2°~4°C）20~30天低溫打破休眠，不需要處理發根劑，即可正常萌芽。

（台中區農改場 林嘉興）



笑 一 笑

麵中芝麻

阿祥：「你的麵中加了白芝麻，我的怎麼沒有？」

阿熙：「不好意思，那是我的頭皮膚！」

（簡正崇）

歡迎投稿



您再也不必受傳統

抗球蟲藥物

使用方法的掙扎了！

## 克寧納斯®

最新抗球蟲計劃的基石

- 非攜帶離子型抗球蟲藥劑
- 能在最易感染球蟲病的時期提供最有效預防能力
- 最強有力的抗球蟲藥劑，能抵抗任何雞球蟲的變異

為更多的資料，請聯絡下列地址：



中國化學製藥股份有限公司  
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市中區廣州路23號 TEL: (02) 3124200  
台北分公司：台北市羅斯福路一段7號2F TEL: (02) 3911362  
台中分公司：台中市工業區中興路18號10樓 TEL: (04) 3596780  
高雄分公司：高雄市中區重慶路二號249號 TEL: (07) 2216096-7  
駐外辦事處：乃美醫學所附屬 紐約工業西路40號 TEL: (06) 6386691-5

製造廠：傑生大藥廠、動物保健部、82340、比爾斯、比利時

JANSSEN  
ANIMAL HEALTH