

種茶，適地適種還要好管理

介紹本省主要栽培的茶樹品種及其栽培要點

本省之茶樹發現於1697年，據「番境補遺」中記載，台灣中部水沙連之深山地帶生有丈餘高之茶樹。目前本省栽培茶樹則係清朝嘉慶年間（1796~1820年）先後由柯朝氏自福建武夷山引進茶種及清朝咸豐年間（1855年）林鳳池氏自福建引進青心烏龍茶苗，清朝光緒年間（1875~1908年）張氏兄弟從福建安溪引進鐵觀音茶苗。正式推廣則始於民國7年（1918年）將青心烏龍、青心大冇、大葉烏龍、硬枝紅心，四大名稱推廣於民間繁殖，民國15年（1926年）自印度引進阿薩姆種於南投縣魚池鄉試種成功，後來陸續推出新育成之品種中有紅茶用之台茶7、8號，部份發酵茶用之台茶12、13號，深獲茶農好評。外銷茶葉興盛時期，茶樹種植面積曾達4萬餘公頃，之後，因外銷茶受生產成本費用高漲等之影響，外銷量逐年減少，至目前（民國82年），現有栽植面積減為2萬餘公頃。

據農林廳調查，本省種植面積最多為青心烏龍10,245公頃，佔總種植面積之49%，其次青心大冇3,900公頃佔19%，台茶12號2,540公頃佔12%，台茶13號922公頃，黃柑775公頃，四季春672公頃，硬枝紅心565公頃，阿薩姆423公頃，青心柑種359公頃，武夷21公頃，另外雖有種植其他品種，但為數不多。

品種之分類

茶樹品種依親緣（葉幅大小）、適製性、樹型或產期不同可作如下之分類：

(一)親緣

分大葉種和中國小葉種兩種，大葉種中印度阿薩姆種適製全發酵之紅茶。台灣山茶亦可製造紅茶，而皋盧之紅茶品質則不佳。中國小葉種適製各類之茶葉，唯以部分發酵茶及不發酵茶為主。

(二)適製性

分不發酵茶、全發酵茶、部份發酵茶三大類。不發酵茶之品種為青心大冇、青心柑仔等。全發酵茶為阿薩姆種、台茶7號、台茶8號、黃柑等品種。部份發酵茶為青心烏龍、台茶12號、台茶13號、鐵觀

農友的福音

綠色大革命神奇有效微生物群
栽培旺(SAION)-EM系列

使用方法：灌土、噴葉
效力：促進發酵分解動植物殘體及新陳代謝改善土壤團粒結構，防止水分養分流失，減少連作之損害，抑制線蟲繁殖，促進發芽增加甜度，延長收穫物之保鮮保藏期限。

日本SANKO公社榮譽出品檢台(83)5字第00351號

商品名	楓木葉企業股份有限公司
栽培旺-EM1號	
栽培旺-EM2號	地址：臺南市府前路一段245號
栽培旺-EM3號	電話：(06) 2233527-9
	傳真：(06) 2295043