

植於土層深厚鬆軟，有機質多之南投縣魚埔及花東紅茶區。

### (九)台茶8號

由印度引進之 Jaipuri 系統中選出，原為184號品系，民國63年命名，幼嫩芽葉為淡綠色，葉為橢圓型，開始採摘期為3月中旬，樹型喬木直立型，枝葉粗疏，易繁殖，扦插及定植成活率高，生長勢強，抗病虫害性強，收量較台茶7號低。適製紅茶，所製之成茶外觀油墨，水色容易帶黃綠色，栽植於南投縣魚池鄉和埔里鎮及花東縣等紅茶區。

### (十)台茶12號(金萱)

親本係以台農8號為母本與父本硬枝紅心雜交，原為2027號品系，民國70年命名，幼嫩芽葉為淡綠色，葉為闊橢圓型，開始採摘期為3月中下旬，管理良好者，採摘期較為提早，扦插及定植成活率較其他品種為高，生長勢強，樹型為橫張性，抗病虫害性強，較耐枝枯病，收量高。適製包種茶，目前全省主要茶區均有種植。

### (十一)台茶13號(翠玉)

親本係以硬枝紅心為母本與台農80號雜交，原為2029號品系，民國70年命名，幼嫩芽葉綠帶紫色，葉為大闊橢圓型，開始採摘期為3月中下旬，管理良好者，採摘期可提早，扦插及定植成活率略低於台茶12號，萌芽數較台茶12號為少，生長勢中等，樹型為直立性，抗病虫害性中等，收量低於台茶12號。適製包種茶，本省主要茶區均有栽培。

### 栽培要點

#### (一)定植時間

本省種茶時期宜選擇天氣濃霧、土壤

潤濕，無風而有微雨時種植，一般約在12月中旬至翌年二月下旬，但本省各地茶區的雨季略有不同，如台東茶地應於一月月底前種植完畢，但南投縣魚池縣則應於梅雨季節時種植。

#### (二)行株距

台灣省茶業改良場育成之台茶7、8、12、13號等四個品種，其樹型高大，其行距宜寬大為1.8公尺，株距0.5公尺，其餘小葉種之行距為1.5公尺，株距為0.5公尺，每公頃約10000~12000株。

#### (三)剪枝

大葉種之剪枝，無論幼木期或成木期，其剪枝面均以水平型剪枝，小葉種之剪枝，幼木期仍以水平型剪枝，成木後則剪成淺弧型。

幼木期之剪枝，台茶8、12、13號，樹型高大，可於去年剪枝面上10公分處施予平行剪枝，促使茶樹早日成園，提早採收。至於其他品種則於去年剪枝面上提高5公分處平行剪枝。成木茶園除阿薩姆系統之台茶7、8號於去年剪枝面上3~5公分處進行剪枝，其餘則於去年剪枝面上高3

## OM 55B 肥料濃度計

肥料檢查器

### 肥料濃度計



EG METER

Green

直接郵購  
特價優待4725元

作物生育最重要者為肥料，但施肥過多反而產生肥傷，作物的生長會停止，較嚴重時會枯萎而死，要改良曾經因肥料過多而發生障礙的土壤是相當困難的，因此使用肥料濃度計事前預防土壤發生障礙是最有效的，亦可測定一般溶液。

友玉企業股份有限公司 新營郵政120號  
電話(06)6322511 F A X (06)6325811  
郵政劃撥03228868友玉企業股份有限公司帳戶