

；葉柄長5.5公分(±0.8公分)；每株葉數11.6片(.1.8片)。其整體外觀形態，屬於葉片狹長、葉色濃綠、葉柄短、節間較短、葉數多、莖部刺瘤少，較受消費者歡迎。

(二) 單位面積產量高：一次採收量為每10公畝2,222公斤(±285公斤)，較原來的「北部竹葉種」高20%；亦較中、南部當當的竹葉種高約20%。

(三) 植株整齊度可達95%，較對照北部竹葉種高10%。

(四) 播種後可以宿根方式採收多次，仍保持葉片狹長、葉數較多等優點，可減少種子費用、降低生產成本。

(五) 植株生長適合北、中、南栽培。

栽培上應注意事項

(一) 栽培時期：在平地，一年四季皆可栽培。北部平地以4~8月份最適合植株生長；南部3~10月最適合。北部在秋、冬、春三季栽培時，需用塑膠布網室或不織布覆蓋，以延長栽培期；南部地區可用水平台網室或簡易隧道棚架紗網栽培。

(二) 播種：用撒播，種子發芽率在80%以上，每10公畝種子用量為15-20公斤。

(三) 灌溉與施肥：薤菜在高溫期生長快速，灌溉甚為重要。若水份不足或缺肥，均會影響其產量及品質。

施肥量為每公頃施用有機肥料20,000公斤，三要素施用量為氮素160公斤，磷鉀80公斤，氧化鉀120公斤。

(四) 病虫害防治：一般薤菜生育期經短(25-30天)，病虫害較少發生。播種後植株約10公分高時、若發生病虫害，可參看「植物保護手冊」所推薦的藥劑防治。

採收方式，割者為佳

薤菜的採收方式通常有兩種：一種是連根拔起的，看起來比較細嫩整齊；另一種是用割下來的，比較不整齊。其實兩者的品質並無差異。然而消費者卻常常只重外觀的整齊細嫩好看，因此造成了「連根拔」的採收方式導向。這樣就連帶造成了生產成本的大幅提高。因為每一次採收就必須有一次播種。如此不但耗費播種工時，種子費用尤其可觀(一分地播種量15~20公斤，時價為4,000~5,000元)。「薤菜桃園一號」具有「宿根栽培，刈收二次而不影響品質」的優點，若能充分利用，即可大大降低生產成本。不過消費者也必須改變「喜歡連頭帶根薤菜」的購買習慣，才能調節市場。

確實發酵·完全腐熟

金雞牌 蛋雞糞

功效
改良土壤、果實豐收

特點
自動化機械處理，品質穩定。
純蛋雞糞製品，肥份足、吸收快。

信心
農委會、農林廳重點輔導，
屏東技術學院專案技術指導。

金雞養雞場 連絡人：洪小姐
屏東縣內埔鄉竹園村永興巷150號
電話：(08)779-7117 • 7782717