

文心蘭虫害防治錦囊

文心蘭花形特殊，宛若翩翩起舞的曼妙女郎，花色變化多，在切花上是極佳的花材；且文心蘭盆花除形態特別外，其花期又長，適合於各種場合的擺設，是倍受歡迎的花卉之一，本文就文心蘭的虫害做一說明，並提供防治方法。

蝸牛與蛞蝓

蝸牛和蛞蝓均為雜食性軟體動物，小蝸牛有殼而蛞蝓無殼。牠們喜食植株幼嫩組織，如嫩葉、新芽、根端、花蕾、花瓣等部位，造成不規則之傷痕或孔洞。小蝸牛於天氣太乾燥或冬天太冷時，會呈現休眠狀態，春暖時即開始活動。蛞蝓則常在太乾燥天氣下死亡，或捲縮身體藏於介質中，待潮濕再復出危害。牠們皆喜歡陰濕有遮陰的環境，於夜晚冷涼或陰雨潮濕白天出沒，尤其夏季高溫多雨期活動最頻繁，生長較迅速。

小蝸牛和蛞蝓爬過的地方，通常留有透明光亮的粘液痕跡，一發現即應馬上防治。

防治方式

1. 清理栽培環境，注意週遭衛生，清除不需用之雜物如雜草、磚石、瓦礫、樹枝等，減少陰蔽物及潮濕，降低其繁殖和生存。

2. 發現其蹤跡時可用殺蝸劑加以誘殺；如用6%聚乙醛粒劑散佈在其出沒之

地方，爬過吃食後死亡。

3. 於放蘭苗之平臺下方，利用水盆裝水後，放置大量的鹽巴，可防止小蝸牛或蛞蝓爬上臺子。

野鼠

常於夜間活動，為喜食花苞、花瓣和新根，而牠們會將葉子從基部啃斷，並啃食偽莖和花梗，影響植株生長，且破壞觀賞價值。

防治方法

1. 保持栽培週圍清潔，清除髒亂的堆積物，以減少其藏匿之處。
2. 以捕鼠器捕殺或施放滅鼠毒餌以誘之。

介殼虫

初孵化之若虫在植株各部位爬行，尋找適宜部位後固定，並繼續危害，一般寄生在葉背，食汁液，發生嚴重者造成葉片黃化枯萎甚至掉葉，且會分泌蜜露，誘發螞蟻和煤病，影響花的品質甚鉅。

防治方法

1. 一般管理良好的蘭園，不會發生此虫子，因為此虫子怕水，因蘭園水份濕度高，故較不易發生。

2. 藥劑防治可參考使用：44%大滅松乳劑1000倍、40%木滅松乳劑1000倍，每隔7-10天噴灑一次，連續3-4次。

蜘蛛

此類動物未直接危害蘭花，因蘭園內溫濕度適宜，故此類動物易發生，蜘蛛經常大量生在植材、花梗、花朵上吐絲結網，結網於花朵上易使未開之花苞展開後破損和掉花，影響切花品質很大。

防治方法

1. 注意園內四週環境，應保持乾淨衛生，清除雜草與雜物，避免害虫及有害動物棲息和躲藏，造成防治上之死角。

2. 藥劑防治可參考使用：日曹蟎可濕性粉劑4000倍、2.8%百滅寧乳劑1000倍+萬靈可濕性粉劑2000倍、2.0%阿巴汀乳劑2000倍，每隔7-10天噴灑一次，連續3-4次。



蜘蛛在文心蘭葉片上生卵塊



蝸蟪啃食後的文心蘭葉片



小小螞蟻也是危害文心蘭的害虫之一。



文心蘭的花苞間有蜘蛛網，會影響切花品質



文心蘭的葉片間有蜘蛛網，會影響切花品質