後植穴可不必覆土。

4.施肥：葱田表土pH若低於5.6時，施用石灰石粉每公頃2,000公斤外，另每公頃施用牛糞堆肥20,000公斤，氮肥200公斤，磷肥150公斤，鉀肥200公斤，施肥法基肥於整地時全量施用牛糞堆肥、N：20%、P_2O_5：100%、K_2O：25%；第一次追肥於定植後20天，施N：20%、K_2O：25%；第二次追肥爲間隔20天後，施N：20%、K_2O：25%；第三次追肥爲間隔20天後，施N：20%、K_2O：25%；第四次追肥爲間隔20天後，施N：20%。

5.病虫害防治：本品種與其他舊有品種一樣有紫斑病、小粒菌核病、銹病、軟腐病、甜菜夜蛾、潛蠅、薊馬與蚜虫等病蟲害，須依農林廳植物保護手冊所推薦之藥劑做正確的防治。

6.忌連作：同一塊土地連續種植3次以上，即有產量銳減，且補植後仍易發生缺株現象，故連續種植2次後即需另覓地區種植，或增施有機質肥料，以免發生連作障礙。

7.經區域試驗結果，目前種植適應範圍爲宜蘭縣、桃園縣與新竹縣等地區。

推廣展望

桃園三號對高溫較具忍受性，故於夏季栽培時若給於適當水份，以保持土壤濕潤仍可望提高產量。另具晚抽苔性與低抽苔率之優良特性，於春作栽培時可降低生產成本。由於頗受試作農民喜愛，可望逐步取代現有栽培品種，提高青葱產量與品質，降低生產成本與增加葱農收益。 ■

