量吸食汁液，使植株不勝負荷而衰萎。陰濕多雨的天候對粉蝨生存甚爲不利，會使害虫密度降低，乾旱期間或溫室內發生較嚴重。但只要少量的粉蝨就會引起消費者困擾。


成虫產卵呈螺旋分散排列，並分泌白色蠟粉覆蓋卵上，藉以保護及固著。孵化之若虫於葉背吸食葉液，並分泌蜜露沾滴於葉面，引來黑霉菌之寄主而誘發煤病，阻礙葉片之光合、呼吸與散熱作用，促使枝葉易於老化，進而導致嚴重枯萎。至2齡若虫以後，由體背、側部分泌白色蠟物，或蛹殼遺留於葉面之蜜露上形成銀白色之徵狀，致使植物受害時有銀色樹變之稱，甚爲影響植物之外觀。

防治方法

1.粉蝨喜好乾燥的環境，在設施內發生比較嚴重，栽種新植株時應予檢查，注意勿把帶虫的植株或種苗帶入設施內，以免其蔓延擴大，另外噴水增加濕度，可防止粉蝨侵入。

2.粉蝨發生嚴重時可噴灑25%布芬淨可濕性粉劑1000倍防治，爲避免抗藥性粉蝨產生可施用2.8%第滅寧1000倍、2.8%畢芬寧乳劑1000倍輪用，或使用5%培丹SP1000倍、9.6%益達胺S1500倍、2%阿巴汀EC1000倍。

3.防治粉蝨的關鍵在於開始防治之前（不管用什麼方法防治）避免大量族群的產生。粉蝨的成虫會被黃色所吸引，所以黃色有黏性的誘虫紙最有效用。誘虫紙放置的位置會是一個問題，因爲粉蝨發生在植株位置並不均一。誘虫紙可以放置在排氣孔、門或生產者經常發現粉蝨的地方。 ■



笑一笑

夫：「你爲什麼堅持哺育母乳？」

妻：「我擔心小嬰兒喝了『牛奶』，將來會有『牛脾氣』！」 （簡正崇）

歡迎投稿

笑一笑

拉保險的對他的顧客說：「這張表格填得很好，可是問到你和太太的關係，你應該寫『夫妻』，而非『失和』。」 （咕嚕）

歡迎投稿