

3.早熟及早產，田間直播至採收，春作和夏作為44-45天，秋作為47-49天，開花至採收，春作和夏作為12-13天，秋作為13-15天。採收期前7天之產量約佔總產量的2/5-3/5，較一般栽培品種

高出12.8%。

4. 著果性良好，開花習性以一節著生一朵雌花為主，故無需摘除發育不良或畸形之果實，產量穩定性亦佳，每分地產量約4,000公斤左右。種植季節以國曆4月間播種栽植較佳。
5. 抗胡瓜嵌紋病毒和木瓜輪點病毒—西瓜系統，耐矮南瓜黃化嵌紋病毒、露菌病和白粉病。

栽培注意事項

1. 播種適期，中部地區在3月上旬至4月下旬，8月下旬至10月上旬；南部地區2月中旬至4月下旬，8月下旬至10月中旬。
2. 砂質壤土或壤土均適合種植，應避免與其他瓜類連作。
3. 種植密度以行距1-1.2公尺，株距40-50公分，每10公畝約可種植2,000株。



「台農一號」胡瓜田間植株生長情形（蕭吉雄/提供）

三冠牌新型系列產品

三冠牌穴植網

專利新產品：新型第78816號

特點：

1. 依各種作物栽植間距預留孔穴，栽植作業方便、整齊。
2. 雜草抑制、透水性、通氣性佳。
3. 肥料、農藥可直接噴灑。
4. 冬天保溫，夏天保涼，耐候性佳，可重覆使用
5. 使用本產品，可避免如PE銀黑布的不透氣，致土壤溫濕度過高易生霉菌、施肥不易及根部腐爛之缺點。
6. 使用本產品可避免如不織布易遭污染、含水笨重及保存不易之缺點。
7. 使用本產品可避免如稻草易生病菌、雜草滋生、壽命短，人工成本高之缺點。



煥坤企業股份有限公司

地址：彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號
電話：(04) 777-3878(代表號) FAX: (04) 778-9778