

台灣 4 月份農作物栽培曆

／桃園區農業改良場、台中區農業改良場
 台南區農業改良場、高雄區農業改良場
 花蓮區農業改良場、台東區農業改良場

桃園地區

高 接 梨	草 莓
1. 高接梨疏果及套袋。 萌芽幼嫩葉片注重病蟲害防治，採集花粉進行冷藏。(倪萬丁) 2. 平地於2~4月採短果枝成熟葉約100片及土壤進行營養診斷。 山地於4~5月間採短果枝新成熟葉約100片及土壤進行營養診斷。(莊俊釗) 3. 黑星病以待克利、護矽得、菲克利藥劑防治之。 梨綠蚜以賽洛寧、陶斯寧防治赤星病以芬瑞莫、三泰芬、比多農藥劑防治(施錫彬)	1. 採收果實。 2. 鉢苗育苗繁殖圃管理。 3. 直接法育苗繁殖圃管理。 4. 草莓後作播種或定植。(李明窓) 5. 薊馬及斜紋夜盜以第滅寧藥劑防治之。(施錫彬)

台中地區

高 梁	葡 萄	高 接 梨
1. 間苗：播種後25~30天苗高約15公分實施間苗每10公分留1株，若缺株可行補植。 2. 追肥、除草及培土：播種後30~35天將硫酸銨(約350公斤)及氯化鉀半量(75公斤)混合當追肥，或以硫酸銨鈣300~400公斤(基肥為複合肥料時)作追肥，同時以中耕機進行培土。 3. 第一次蟲害防治：播種後35天若有蚜蟲或玉米螟可以90%細乃得粉劑3000倍，每公頃0.3~0.4公斤用量施用，或一品松乳劑1000倍，每公頃0.8~1公升用量。	新梢生育調整、誘引、促進著果，開花前後病蟲害防治。	病蟲害防治、套袋、橫山梨徒長枝抑制。

台南地區

胡 麻	落 花 生
1. 間苗：苗高5~10公分行第一次間苗，苗高15~20公分行第二次間苗 2. 株高30公分左右行第三次間苗及施追肥：硫酸銨50公斤/公頃，氯化鉀50公斤/公頃 3. 中耕培土，以防止倒伏。 4. 始花期應行第一次灌溉。 5. 若遇雨季，應注意排水。 6. 病蟲害防治：生育中隨時注意，若發現蚜蟲、紅蜘蛛、金龜子，應即刻防治，藥劑可用90%納乃得3000倍，18.5%大克蠟500倍或35%芬佈克滿500倍、50%加保利500倍。	1. 若田間乾燥，在莢果充實期，應行第三次灌溉，此時約播種後80天左右，以增加產量。 2. 病蟲害防治：生育中隨時注意，若發現紅蜘蛛、小白紋、毒蛾、甜菜液蛾、蚜蟲、小綠葉蟬等應防治，可用40%陶斯松1000倍、或用2.8%第滅寧1000倍、或18.5%大克蠟400倍等參攷「植物保護手冊」所列方法施用，若發現有葉斑、銹病等病害應行防治，可用80%鋅錳乃浦400倍或28%比多農2000倍或47%三得錳800倍等依「植物保護手冊」之記載施用。

感謝桃園區農業改良場林文忠先生、台中區農業改良場高德錚先生、台南區農業改良場李振先生、高雄區農業改良場鄧耀宗先生、花蓮區農業改良場鄭仲先生、台東區農業改良場劉清和先生協助提供資料。

高雄地區

印 度 紫	蓮 霧	薑 蓆 花
<p>1. 燈照處理者，本月施行整枝修剪、搭設棚架、雜草防除。少量施用過磷酸鈣。灌溉每週1次。病蟲害應注意白斑星天牛的發生。</p> <p>2. 未燈照處理者，選留生者，選留生育健壯的新梢，注意雜草防除。</p>	<p>1. 立秋花：上旬長出第二次新梢，提高氮肥用量。防治薊馬及蚜蟲。</p> <p>2. 白露花：第三批花疏花、疏果及套袋，防治薊馬、蚜蟲、果蠅及果腐病、炭疽病。 提高氮肥用量以培育大量第一次新梢。防治薊馬及蚜蟲。</p> <p>3. 寒露花：中旬起開始採收第二期果。</p> <p>4. 冬至花：加強肥培及防治、果蠅及果腐病、炭疽病。</p>	<p>栽培管理：加強水分管理，施用追肥。</p> <p>病蟲害防治：加施一次毒絲本粒劑，並以四氯異苯精、腐絕快得寧、貝芬醯醯及撲克拉等藥劑輪流使用，以防治赤斑病。</p>

花蓮地區

文 旦 柚	玫 瑰
<p>本月份春季溫度逐漸回昇，為文旦柚生理落花落果期。潰瘍病、瘡痂病、黑點病的病原菌在下雨的情況下較易感染，以波爾多液、錳錒乃浦、免賴得、睛硫醯等殺菌劑防治。噴施殺蟲劑大滅松、馬拉松、加保扶等保護幼果。乾旱時紅蜘蛛、銹蟬、薊馬、介殼蟲等漸活躍也應噴藥防治。（劉昭雄）</p>	<p>剛栽植的植株，雖仍會開花但枝條纖細而短，花朵小瓣數少，不適作為切花，此時除了隨時剪除枯枝病枝外，也應隨時摘心（花蕾），一直到主枝養成之後，才能開始生產切花。</p> <p>由基部芽發育成的粗壯枝條，待頂花芽花萼反捲，花瓣完全著色時剪除上部1/3的長度，所留下的部份即為植株生產切花之主枝。</p> <p>蚜蟲多於春季發生，聚集在嫩枝或花蕾，成蟲及若蟲均危害花部，刺吸植物汁液，使心葉、花苞皺縮或無法正常伸展，防除上使用殺蟲劑即可防治。（蔡淳瑩）</p>

台東地區

綢	料	玉	米
<p>一、間苗、除草及第一次追肥</p> <p>1. 播種後28~35天苗高約20~30公分時健苗1株，遇缺株時，前或後留2株。</p> <p>2. 間苗後於離根際5~10公分處點施肥料，整地栽培並行小培土掩蓋肥料，若遇雨土壤水份太多，不宜培土，否則易染莖腐病。</p> <p>3. 不整地栽培時，不需培土，若雜草過多以定向罩，於無風時噴施殺草劑（巴拉刈或年年春）</p> <p>二、灌溉及病蟲害防治</p> <p>1. 生育期間須注意，田間土壤水分含量寡，尤其在播種後30~35天的齊蔴期及播種後50~70天的抽穗期及吐絲期均需要足的水份。</p> <p>2. 全生育期須注意病蟲害防治</p> <p>(1) 玉米螟可噴施45% 品松乳劑1000倍，抽穗前在玉米心葉上施放3%加保扶粒劑，每株約0.8公克。</p> <p>(2) 蚜蟲可用24%納乃得溶液1000倍噴施。</p> <p>(3) 葉斑病、煤紋病可噴施80%錳錒乃浦或80%錳錒乃浦或65%錳錒乃浦可濕性粉劑400倍稀釋液。</p>			