

台灣 7 月份農作物栽培曆

／桃園區農業改良場、台中區農業改良場
台南區農業改良場、高雄區農業改良場
花蓮區農業改良場、台東區農業改良場

桃園地區

水	稻	草 蓆
上旬：水稻分蘗期停止灌概。 中旬：水稻收割。收割時應將稻草切碎，於整地時將之打入土中。 整地：以曳引機或耕耘機整地，蓋平前施基肥。 第二期作育苗：選種、消毒、浸種、催芽、播種。每箱苗土攪拌肥量為硫酸銨：過磷酸鈣：氯化鉀=5克：5克：3克。 播種：每箱播種量為經催芽後之種子250克，播種後，進行箱土消毒，隨後將之堆積，堆積高度約25箱，1-2天後移至秧田。 秧田管理：出秧後即灌水再排水，以後視濕潤狀況，調節灌排水。 下旬插秧：秧苗葉齡2.5-3.5葉或苗高10-15公分即可移植，每公頃約需220箱秧苗，行株距約30×15公分，插秧後，防除福壽螺及施用殺草劑防除雜草。田水深度保持3-5公分高。（陳素娥） 基肥（第二次整地前施用）：每公頃施用硫酸銨120~140公斤。過磷酸鈣165~220公斤（戴堯斌）		育苗繁殖體灌水、除草管理 炭疽病以撲克拉防治。葉芽線蟲及斜紋夜盜以芬滅松藥劑防治

台中地區

毛 豆	食 用 甘 藷	葡 萄	高 接 梨
1.間苗、補植及灌水第一次病蟲害防治。 2.中耕培土、除草及施追肥。 3.開花期，第二次病蟲害防治及灌水。	1.夏作整地耕種及施基肥等作業同春作。 2.春夏作插植者進行灌泥及病蟲害防治及理蔓。	採收（夏果）疏枝、修剪、刈草、病蟲害防治。	新熟等品種收穫、出售、施用藥肥。

花蓮地區

水	稻	文 旦 柚
第二期作秧苗期至插秧期整地：將前作收穫後切碎之稻稈、稻穗翻耕與晒田。插秧前3-5天前灌水，施用基肥後，利用曳引機，並配合田間適度水量，進行細整地與蓋平工作。 施基肥：有機質肥料全量於細整地施用。化學肥料硫酸銨每公頃500~600公斤，過磷酸鈣300~350公斤，氯化鉀80~120公斤。氮肥施用量為全量25%，磷肥50%，鉀肥40%或施用台肥39號複合肥料。 育苗管理：選用採種田合格種子，播種前確實做好浸種、消毒與催芽等種子預措工作。具有休眠性種子如台種2號、高雄142號，收穫後應充分曬乾、貯放兩週後，再加強浸種與催芽工作，促進發芽整齊，播種時，勵行疏播，每箱播種200-220公克。 插秧：掌握插秧適期，於生育後有東北季風或穀粒充實期氣溫下降之地區，宜提早插秧，以免影響產量與米質變劣。播種後10~12天，苗齡達2.5~3葉時為插秧適期，插秧時以寬行密植方式，力求淺植，南北走向，每公頃秧苗以220-250箱為宜，插秧後立即施用三苯醋錫以防治福壽螺。 雜草防治：插秧後三天內施藥，參考「植物保護手冊」使用推薦之藥劑。		本月份已進入炎熱夏天，文旦柚果實已成長大果，果園雜草以割草機割剪，避免清耕，防止土壤過於乾旱。 颱風季節即將來臨，巡視果園排水系統豪雨前清除雜物避免堵塞。注意果實蠅誘殺防治工作。

感謝桃園區農業改良場林木忠先生、台中區農業改良場高德鈺先生、台南區農業改良場李根先生、高雄區農業改良場鄧耀宗先生、花蓮區農業改良場鄭仲先生、台東區農業改良場劉清和先生協助提供資料。

高雄地區

水	稻	毛	豆	芒	果	印	度	棗	茄	子
最高分蘗期施第二次追肥，進行間斷性灌水。分蘗停滯排除田中水分，充分晒田。幼穗形成期施穗肥，實施深水灌溉，維持水深5~10公分。 稻紋枯病防治：自七月第六半旬至九月第一半旬防治，重點防治在八月第三半旬至第六半旬。 稻毒素病防治，自七月第三半旬至九月第二半旬。縱捲葉蟲防治自七月第一半旬至九月第五半旬；重點防治在七月第二、三半旬。	第一次噴藥防治潛蠅、夜盜蟲。第一次中耕除草、施追肥培土及灌溉。 第二次噴藥防治斜紋夜盜蟲、擬尺蠖及葉蟬等。 除草、灌溉及第三次噴藥防治花薊馬、葉蟬、炭疽病等，保持田間濕潤及清除雜草。	第一次噴藥防治 潛蠅、夜盜蟲。 第一次中耕除草、施追肥培土及灌溉。 第二次噴藥防治 斜紋夜盜蟲、擬尺蠖及葉蟬等。 除草、灌溉及第三次噴藥防治花薊馬、葉蟬、炭疽病等，保持田間濕潤及清除雜草。	修剪—— 果實採收後進行枝條修剪，將彎曲、下垂結果枝做回頭縮剪，保留1-2節促其再長新梢，培養翌年結果枝。 對於衰弱、罹病、細弱、枯枝枝條，宜自基部剪除。	燈照處理者在此月正值開花期，應行整枝修剪、誘引枝條、剪除弱枝及交叉重疊的枝條。施肥應加強磷肥的施用。為了防止缺磷症發生，可以硼砂溶液400倍自開花期開始噴施，每10日1次，連續5次。注意白粉病、煤病、白斑星天牛、毒蛾、盲椿象的防治。夏季容易有乾乾濕濕的現象，對棗樹生育不利，加強灌溉排水。未燈照處理者有小花苞。應加強磷肥的施用。其餘管理均相同。	育苗：採穴盤或苗床育苗均可，每10公頃約需800株成苗。進行苗期管理工作。					

台南地區

水	稻	落	花	生
施用堆肥，整地前5~7天，二期作插秧前施用有機堆肥，雞糞每分地1500公斤，或豬糞堆肥2000~3000公斤後，行第一次整地。 第一次整地，插秧前20~30天，一期作收穫後，稻草已晒乾行第一次整地，力求深耕，但土壤不必打得太細，使土壤底層通透性良好，以利根群發育。 施基肥及第二次整地，插秧前2~4天，每公頃施用硫酸銨400公斤、過磷酸鈣400公斤、氯化鉀40公斤或複合肥料39號400公斤後，行第二次整地。 除草劑整理（萌芽前處理）：整地耙平前每分地撒佈滴滅草乳劑200cc（半瓶）後耙（整）平。 防治福壽螺，插秧前1~3天，以三苯醋錫（保稻安）可濕性粉劑噴施，每包（100公克）可防治3分地。	上、中旬：準備播種事宜，若乾旱無下雨之跡象，先行灌溉，以保持土壤濕潤，利於發芽。 下旬： ①整地播種：採機械整地、作畦、播種一次完成。 種子量：種子120~150公斤/公頃，播種時以每公斤種子拌2~4公克之5%大克爛拌種消毒，以提高種子發芽率。 ②整地前可施肥料以增加產量 堆肥：10,000~15,000公斤/公頃， 硫酸銨50~100公斤/公頃，過磷酸鈣150~300公斤/公頃，氯化鉀50~120公斤/公頃。 ③作畦栽培：畦寬90~100公分每畦2行，株距10公分。 ④萌芽前雜草之防治：可用43%拉草200倍或34%施得雷350倍，於覆土後施用以防雜草之發生。 ⑤生育初期易發生莖腐病、冠腐病等，防治上可於播種前以種子保護劑拌種，以保護種子及幼苗。 ⑥生育初基若發現台灣大蟋蟀、切根虫及斜紋夜盜，可用50%加保利拌甘藷蓑誘殺或噴施22.5%陶斯松乳劑750倍稀釋液。			

台東地區

水	稻	大	豆	小	米
整地 1.請水利會配合按同時段，同時期灌水，以節約水資源與提高整地效果。 2.利用曳引機，田間保持適度水量，減少機械作業速度，並加裝耙平設備，將傳統的整地須三~四次減至二次，並在第二次同時進行耙平工作。 3.擴大代耕規模。		1.大豆發芽出土後一週內以90%納乃得可濕性粉劑2000倍稀釋液進行噴藥一次，防治潛蠅類為害。 2.種子發芽後15天內進行缺株補播，苗高約10~15公分時行間苗，每穴留存健苗2株。 3.不整地栽培時，不需培土，若雜草過多，套用定向罩，於無風時噴施殺草劑（巴拉刈）。		資材準備 1.種子：每公頃條播4公斤，撒播5公斤。 2.肥料：每公頃硫酸銨500公斤，過磷酸鈣300公斤，氯化鉀100公斤。 3.農藥：40.6%加保扶水懸粉45%一品松乳劑等。 氮肥用量視土壤肥力而增減	