

### 防治方法

目前並無藥劑推薦於蔬菜害蟎之防治。當發現葉後有葉蟎活動時，可參考下列藥劑輪流使用，以免葉蟎發展出抗藥性。

1. 10%畢芬寧可濕性粉劑4,000倍（安全採收期為6天）。
2. 2.8%賽洛寧乳劑1,000倍（安全採收期為10天）。

### 蚜虫類

網室水耕蔬菜多栽培十字花科及菊科2類蔬菜，為害的蚜虫主要有偽菜蚜（*Lipaphis erysimi*）、菜蚜（*Brevicoryne brassicae*）、桃蚜（*Myzus persicae*）、棉蚜（*Aphis gossypii*）及萵苣蚜（*Dactynotus formosame*）等。蚜虫俗稱龜神，體長不超過3mm，體色隨季節、食物而多變。

本省氣候高溫多濕，蚜虫終年可發生。又因體形細小、增殖率高、可依靠風力作長距離遷移，在乾燥環境下，族群增長迅速。由於水耕蔬菜葉面常保乾燥狀態，對於蚜虫危害尤須留意。

### 防治方法

發現新葉有蚜虫時，可採用下列藥劑擇一防治。1~3項藥劑之安全採收期為4天，4、5項則為6天。

1. 58%乃力松乳劑1,000倍。
2. 50%馬拉松乳劑1,500倍。
3. 3.5%魚藤精乳劑500倍。
4. 2.8%第滅寧乳劑1,000倍。
5. 10%畢芬寧可濕性粉劑4,000倍。

### 斜紋夜盜虫


本省全年均可發生，成虫暗褐色，前翅有多條縱橫條紋，其中以翅前緣中點斜至後緣基部之條紋最為明顯，後翅白色，

日本鱷魚牌



園藝用刀剪工具

本公司代理日本鱷魚牌園藝用剪定鋏、剪定鋸、採果鋏、高枝剪、葡萄鋏、布剪等。以高炭素刃物鋼材製造，表面鍍硬鉻，銳利耐用。惟市面上仿冒品甚多，敬請認明商標，指名購買。（歡迎索取目錄）



台灣總代理



台灣農業資材股份有限公司

台北市迪化街一段86號 TEL:(02)5564253 FAX:(02)5562357