

→ 爾蒙分泌不會有任何的影響，但是，有一些人可能會感到不適，例如，下腹部疼痛、腰酸、輕微的點狀出血、月經量增多等現象，此時，必須求助於醫師，診察是否有因裝置時未詳測子宮深度及方向，導致子宮穿孔，或因消毒不完全，而有發炎的現象。

裝置後1星期內最好不要發生性行為，不須住院，馬上可以工作，一般不含銅的避孕器不必更換，可用到想生孩子，或屆更年期再取出即可，至於含銅者，由於效力會隨時間而減退，最好3至5年加以更換。

有什麼注意事項？

子宮內避孕器雖然避孕效果很高，但是，仍有約2到3%的失敗率，萬一還是懷孕了，不含銅者可以不必取出，待胎兒出

生，即會隨胎盤排出體外；不過，若是使用含銅避孕器的婦女，就必須儘快將其取出，或者施行人工流產，否則，可能對胎兒造成傷害。

另外，子宮內避孕器有可能會排出體外而不自知，尤其是月經來潮期間，婦女應學習自我檢查（將乾淨的右手食指伸入陰道內，看是否能觸摸到避孕器尾端所留的尼龍檢查線），裝置後1年內應回院檢查2次，之後，每年定期檢查，期間有任何問題，均應立即求醫。

### 口服避孕藥

避孕的原理：

口服避孕藥的成份是合成動情素及黃體素2種女性荷爾蒙的製劑，利用體內回饋作用，影響腦下腺分泌卵泡刺激素、黃體刺激素，進而抑制排卵；其額外的作用，是可使子宮頸黏液變稠，阻止精子進入，且在2種荷爾蒙的作用之下，子宮內膜增生不全，不利於受精卵著床。

根據統計，按時服用口服避孕藥的婦女，避孕的效果在99.9%以上。

適用與不適用的對象：


只要經醫師診察，認為健康的婦女都可服用，但是，仍有一些不適服用的對象，包括已懷孕者，哺乳者，34歲以上有抽煙習慣者，患有腦血管、血栓栓塞疾病、肝病等的人，此外，未成年少女應避免服用，以免發生體格發育停滯的現象。

如何服用？

口服避孕藥可在各地的衛生所取得，只要經醫師診察、處方，護理人員指導後，即可領用，衛生所只收成本費。

服用法依對象略有不同。一般婦女自月經來潮的第5天開始，以28天為一個週期，每日服1粒；產後婦女未哺餵母乳者

日本原裝OREC牌.強力耐用  
RM85A有機農法最佳幫手  
割草寬幅850mm，高度10-70mm



特點：

- (1)可四輪傳動，機動性高。
- (2)重心低，傾斜地面行走能力優越。
- (3)停放所需面積小。

竹下農機股份有限公司  
台北市武昌街2段118號之1

服務專線：02-3893896 FAX：02-3614134

台中市東山路一段55號之10

服務專線：04-4360780 FAX：04-4371325