

請加強消毒與防疫， 儘速消滅口蹄疫

/農委會

口 蹄疫目前正流行於本省，爲了控制疫情，防止疫區擴大，請您注意下列消毒方法與防疫措施，大家一起努力儘速消滅這次疫病。

消毒方法

一、欲消毒的物件表面先清洗乾淨，

消毒的效果才好。

二、對口蹄疫有消毒效果的消毒劑及使用濃度如下：

■合適的消毒水

凡對口蹄疫病毒有效的消毒水，其包裝外會註明對此病毒有效。使用的稀釋倍數則依照其說明。



選擇適當的消毒劑消毒豬舍，才能做好防疫措施



豬場的衛生管理工作首重管制人員和車輛的進出

→ ■ 2% 鹼片液

製備方法為將1公斤的鹼片溶於50公升的熱水中，鹼片可在化工原料行購得。

■ 2% 檸檬酸（枸橼酸）液

製備方法為將2公斤的檸檬酸（枸橼酸）粉末溶於100公升的水中，化工原料行亦可購得。

■ 2% 醋酸液

製備方法為將2份冰醋酸溶液加上98份清水，混合均勻。

三、千萬不要將酸性及鹼性消毒溶液同時使用，否則酸、鹼中和之後則失去效用。

四、豬舍、豬隻、人員及車輛使用酸或鹼液的建議如下：

1. 豬舍

鹼片液是最常被使用的，但鹼液會腐蝕器械表面，且對豬隻會造成傷害，所以建議用於空豬舍四周，不可直接噴灑於活豬。

2. 豬隻

使用合適的消毒水，具有傷口收斂作用的更佳。2% 檸檬酸溶液也是便宜又有效的消毒劑。

3. 人員及車輛

(1)合適消毒藥水。(2)檸檬酸（枸橼酸）液及醋酸液可適用於日用器物消毒。物

品浸泡數分鐘後需再以清水完全沖洗，本液不適用於消毒插電式的腳墊。(3)人員進出可用2% 檸檬酸液清洗及刷手。

防疫措施

■ 未染場之處置（自衛防疫）

一、畜舍及周圍加強消毒

1. 2% 氫氧化鉀、4% 碳酸鈉、2% 枸橼酸或合適消毒藥水。

2. 牆壁、隔欄、床面、通道及圍牆使用高壓噴機霧消毒，畜舍若磚造者再用噴火機消毒其縫隙。

二、管制人員及車輛進出

1. 為防止攜入病原體，一律謝絕訪客入內，同時嚴禁工作人員出入其他牧場。

2. 工作人員需更工作衣、帽子、雨靴、口罩，踏過消毒槽後入場工作；出場時更換自己衣物後離開。

3. 限制車輛出入牧場，不得不出入之各種車輛，一律以消毒藥水徹底噴霧消毒車輛或通過淺型消毒池。

■ 感染場之處置

依動物傳染病防治條例規定限制感染場動物移出，動物防疫人員在國軍協助下執行全面撲殺、掩埋等工作，掩埋場地與豬舍加強消毒。

■ 感染場死亡動物處理

依動物防疫人員指示處理，原則上發生口蹄疫之牧場，其病死家畜以就地焚化或掩埋為原則。焚化處理除使用焚化爐外，亦得以柴火焚化之。以掩埋方式處理時，則確實消毒處理，掩埋場樹立告示牌。

無法就地處理時，直轄市家畜衛生檢驗所或縣（市）政府家畜疾病防治得指示以化製處理之。