

因為花朵奇大無比，花冠直達25公分，花全長45公分，全花重達350~500公克。

授粉成功的花朵，果房在第6天明顯膨大，至25天，果實開始變紅，果實由綠色轉紅後第6天，果皮有光澤出現時，即可採收，夏季時，由開花那天算起，第30天即可採收，但是到了11月，氣溫較低時，則需40天才能採收。各種不同品系仙人掌蜜果，其果實成熟所需時間並不一致。

四、生長條件及植株特性

1. 溫度

仙蜜果為熱帶植物，並不耐寒，如果長時間溫度低於8℃，葉片會發生散發性的黃色凍傷，但是並不影響其生長。在冬天會下雪的山區不宜種植。

2. 土質

野生之三角柱皆長在岩石縫間或海邊沙池上，對土質要求並不高，不論平地、山坡地、水田、旱田或鹽份地均可種植。

3. 耐水

據實驗將仙人掌蜜果植株的下半部泡

在水中15天，並未有發生根莖葉腐爛的情形，但如果全株植物泡在水中以至沒頂，長時間無法呼吸則必死無疑。雖然它耐水，但是種植時仍應避免積水、土地保持潮濕透氣有利生長。

4. 耐熱

仙蜜果原為沙漠中的植物，耐熱性毋庸置疑，其莖貼在石頭上，根吸附在可以把人體燙傷的石塊上皆能安然無恙

5. 抗風

只要支柱夠牢固，仙蜜果植株本身能抗強風，經1996年賀伯颱風的吹襲，未有發生斷枝、落花或落果的情形。

五、繁殖方法——扦插

切下一段約30公分長的仙蜜果三角柱枝條，放在陰涼處1星期，傷口癒合後再行扦插，可減少切口感染腐爛機會，長根發芽率達95%，此法最為簡便且能保有母株之特性，為普遍被採用的方法。植株的自然發芽生長期間在每年的10月至翌年5月，但扦插全年都可行。1月份種下的已 →

仙人掌蜜果 推廣中心



(新品種～紅龍果)

- ◎特大超甜新品種
- ◎抗病力強、無農藥健康水果
- ◎果超甜，花朵亦好吃！！
- ◎全球未來流行新趨勢
- ◎水田、旱田轉作最佳選擇

紅龍果苗批發零售

大茂種苗圃

台南縣善化鎮陽明新村 105 號 TEL : (06)5851999 或 090742119