

# 台灣 土雞新品種

省畜試所家畜育種系 / 鍾秀枝

(接上期)

## 台畜肉13號

### (一)新品種特性

單冠、具黃褐色羽毛、體健、產肉能力佳，達16週齡體重約1.5公斤，肉質鮮美。

### (二)新品種優點

優點：抗病力強、育成率佳、屠體脂肪率低、肉質鮮美。

### (三)飼養管理應注意事項

#### 1.飼養管理之主要流程：

選種→配種→種蛋收集貯存→系統孵化→雌雄鑑別→系譜登記→育雛(0~5週齡)→育成(6~16週齡)雞隻於0至16週

齡期間係採平飼方式飼養，16週齡以後則出售。

#### 2.種蛋收集與貯存：

以畜試公系之公雞與畜試母系之母雞進行雜交後，第2天開始收集種蛋，並貯存於貯藏室(室溫維持在10~15°C)約1~2週。

#### 3.孵化操作：

(1)種蛋入孵前先退冷，退冷後冷孵待孵卵機溫度至80°F以上，進行燻煙消毒(使用福爾馬林三倍液燻煙消毒20分鐘)。  
(2)孵化至7至18日分別驗蛋檢除無精蛋與中止蛋。

(3)孵化至18日移蛋至發生盤等待小雞



台灣省畜產試驗所畜試土雞台畜肉十三號之外表型

孵出。

(4)小雞孵出後進行 M.D 預防。

4. 育雛期飼養管理 (0~4週齡)：

(1)入小雞前育雛器先給溫至95°F及點引導燈。

(2)教槽2~3日 (飼料與水混合成粒狀置於平盤上)。

(3)保溫1~3週 (依外圍環境溫度高低而決定廢溫否)。

(4)剪嘴 (利用立地式剪嘴機於2~3週剪嘴)。

(5)飼料調整方式：

0~4週齡給育雛期飼料 (5週齡起改飼生長期飼料)，其重要營養成分包括：代謝能3200kcal/kg、蛋白質23%、有效磷0.45%、鈣0.85%，以及含硫胺基酸0.

94%。

5. 生長——育成期飼養管理 (5~16週齡)：

(1)小雞廢溫後飼養於開放式雞舍內 (舍飼)。若要放養山雞，宜於6~8週齡後放養較安全。

(2)飼料調整方式：

(A)於5~10週齡期間飼給生長期料，自11週齡起則改飼肥育期料。

(B)生長期料之重要營養成分包括：代謝能3000kcal/kg、蛋白質19.0%、有效磷0.35%、鈣0.80%、含硫胺基酸0.72%。

(C)肉後料重要營養成分包括：代謝能3000kcal/kg、蛋白質17.0%、有效磷0.25%、鈣0.75%、含硫胺基酸0.56%。