

黃色較偏好，便將誘殺器改為黃色，且因中腰的四個大圓孔易受風雨日光侵害，易使藥劑失效，於是將圓孔方向改為向下，效果良好。後又因甲基丁香油藥效無法持久，僅約10~15天。於是，改良成目前推廣之“中興式誘殺器”將其身改為長10cm、內徑4cm，近底部處2側各開一大圓



含毒甲基丁香油甘蔗板（右）和誘殺盒，合併使用。

孔，將底部原來豎立之小鐵線改成小木柱，其上為細纖維板，再上為倒立之小瓶裝含毒之甲基丁香油瓶口緊接纖維板，並透過其滲透作用，使藥液滲出揮發，藥效可維持達到3個月以上。

■空中防治

在果農無法防治處，政府利用直昇機沿山邊或相鄰果園山丘之雜木林空投誘殺板，以誘殺藏匿於林間之成虫。每1.5個月空投一次，全年共空投5次。此防治法在本省施用效果非常的好，除田間果實蠅密度已降至低水平外，果實之被害情形亦顯著降低。

綜合防治

乃是綜合上述幾點一同來防治，不過要視地區情況，並不是每個地區皆適用。

防塵 防毒 濾臭

盛將有限公司
SAFE AIR CO., LTD.
 台中縣大里市西湖路 5-13 號
 TEL: 04-4927569, 3327569
 FAX: 04-4925233