



→ 避孕效果不佳的情形。其服用方法如下：

1. 一般婦女：在任何一次月經來潮的第五天都可以開始，每晚臨睡前吃。
2. 新婚婦女：最好在結婚前一個月，月經來潮的第五天開始吃，先使自己適應一個月。
3. 產後婦女：足月產婦於產後二至三週開始吃；但欲餵母乳者不可使用口服避孕藥（會降低乳汁分泌），改使用其他種避孕方法。
4. 自然或人工流產婦女：於流產當月及流產後五天內儘早開始服用。

問四

在剛開始服用口服避孕藥時，常常會因事情忙碌而忘記服用口服避孕藥，怎麼辦？

答：1. 如果第二天想起來，應儘速在十二小時內補服。

2. 如已超過十二小時，就趕快補吃忘記的那一粒，當天應服的一粒仍須按時服用。

3. 如連續兩天忘記服用，應連續兩天服用兩粒，以後再每天服用一粒。雖已補服，但恐避孕效果受影響，必須兼採其他避孕方法，如保險套等。

4. 若兩天以上忘記服藥，而發生出血現象時，則停止服藥，當作一次月經，再從出血第五天重新開始吃另一包新藥。

問五

什麼是醫師處方藥？為什麼口服避孕藥是醫師處方藥呢？

答：依藥事法施行細則第三條規定：醫師處方藥係指經中央衛生主管機關審定，在藥品許可證上載明需由醫師處方或限由醫師使用者。因口服避孕藥是賀爾蒙製劑，對人體的新陳代謝和血液循環會產生影響，必須經由醫師診察，依個人的體質判斷是否適合服用口服避孕藥。 ☞

安豐牌網室專用網

農、漁、牧、養殖業專用

主要產品：

木瓜網室防蟲專用網・蔬菜網室覆蓋網・養殖業保溫網・果樹防鳥防蠅網・溫室網・針織遮光網・高級紗窗網・建築用安全護網

吉田塑膠織網股份有限公司

住址：彰化縣鹿港鎮彰頂路22巷137號
TEL: (04) 7711621 FAX: (04) 7716328

