

再生稻不宜盲目推廣

/ 劉斌

大甲鎮公所農業課課長李隆盛表示：依據大甲地區試驗再生稻結果，發現再生稻容易寄生黑尾浮塵子和褐飛蟲等病蟲害，且有產量減少，稻禾成熟不一致等缺點。

栽培再生稻，必須具備下列六個條件。（以下是筆者造訪農會推廣人員及農業專家的結語）：

(一)排水良好，灌溉方便之稻田。因為「再生稻」全部生長至成熟前不能缺水或晒田，田間至少必須保持濕潤狀態。

(二)中等質地以上或較偏向壤土、微粘性之稻田較佳，才能達到產量穩定。

(三)一期作水稻氮肥使用不夠，遇到惡劣氣候仍不會倒伏之稻田，成功率最大。

(四)第一期作要選用再生力強之品種，


例如梗稻台農67號、台農70號、台中糯70號、台中190號、秈稻有台中秈3號、台中秈糯1號。

(五)第一期作應注意防治雜草、紋枯病、收割前15天施一次氮肥。梗稻收割時，應從地面上約3公尺處割斷，不必割第二次，秈稻則先從地面上約20公分處割斷，再等約10天，下面之節位長出再生芽後，再從地面上約3公分處割一次。

(六)不管梗稻或秈稻，第一次收割後12天內，清除田間雜草及稻草，並噴射殺蟲劑，隨即灌水，使土壤保持濕潤，施下肥料三要素化學肥；抽穗前後仍不可晒田，並注意噴施稻熱病防治藥劑，可減少發生病蟲害。

■



各種尺寸穴盤，成型專業製造，品質好，不易破損，價格低。適合山地造林及所有苗木之育苗和大量栽培使用。



暉洲塑膠股份有限公司

台南市新義路 31 號

TEL / (06)2630526-8 FAX / (06)2912795



西瓜苗防風罩，
專利通過，歡迎認購。