

→ 分的距離。

△紅外線燈——最適合卷曲而且燙過的髮型。紅外線燈泡在電器行或美容材料行都可買到，普通插座適用。如果你的頭髮是自然卷、波浪狀，或不太複雜的髮型，使用燈照將可減少傷害。

△電髮卷——電髮卷可以使你的吹髮技術達到「職業水準」，但若使用不當，則會灼傷頭髮，為了安全起見，還是選擇捲上後會產生蒸氣的髮卷，比較保險。如果你是長頭髮，必須使用數個髮卷，與其整晚戴著卷棒睡覺，不如選擇省時方便的便髮卷。

為了避免頭髮分叉、斷裂、乾燥，一定要遵守預防措施。例如，電髮卷不能用於濕的頭髮，或是過度吹理的頭髮。而且，除非電髮卷本身已有保護頭髮的設備

——包有柔軟的海棉，防止頭髮受到拉或壓，否則每次捲髮前，都應在髮梢墊放一張薄紙，以免捲得太緊，損傷正常髮質。

△卷髮棒——如果你的頭髮染過或是非常乾燥，那麼蒸氣式卷髮棒，就是最安全的整髮器。千萬不可將卷髮棒用在濕頭髮上，因為它會使頭髮燒焦。卷髮棒捲上頭髮後，要停留幾秒鐘，如果頭髮仍然不鬆，就不必勉強，慢慢取下髮卷，以免頭髮斷裂。

△髮型梳——髮型梳適用於乾性頭髮，能使頭髮柔順易梳，而且蓬鬆，目前市面上的髮型梳本身都附有噴口，可以噴出霧水，有潤髮作用。假使你的頭髮厚而粗，髮型梳可以幫助你梳出理想髮型，但對於纖細柔軟的頭髮則效果不彰。

讀者來函

天工園 / 張鎮邦

1. 我們國內有的專家以為鉀肥施用量與果肉甜（糖）度有相關，我不敢說他們錯，但我無論由書上（五洲的果樹生理學）得知或經過驗證，磷肥與甜度亦有相關。而鉀肥較多祇是在營養生長轉變至生殖生長時，可使樹體儲存更多的碳水化合物罷了，另外，鉀肥可幫助著果，甚至幫助果實膨大，不過在缺水時施用鉀肥對提高果實甜度之效果特別顯著。
2. 要促進花芽分化，除了需打破休眠、枯水、修剪、斷根、倒裝、環狀剝皮、灌水……外，逆境生長以抑制營養生長，乃是促進花芽分化最佳環境，譬如市區

道路上的水泥縫、路邊等，有些營養不良、缺少水份、環境惡劣的小草，往往特別能開花結果，就好像從前的「苦命人」生一窩兒子一樣，這可能就是在生存危機中的機轉吧！

3. 落花落果除了因雨天太長（突轉晴時易形成剝落層，但桃樹自花授粉時反而需要綿綿細雨）、授粉不良、溫度不適、水份不穩……外，土壤肥力亦為重要因素。

歡迎同好、農友指教，若有錯誤，還請包函。