

2. 其他如車輛、衣服、餵水、器械、精液、乳汁及飼料等亦會擔任傳播病毒的角色。

三、經風（空氣）傳播：

1. 牧場內：發病動物會經由呼吸排出大量具感染能力之病毒飛沫，而感染給場內動物。

2. 牧場間：需要特殊的氣候條件下才會發生，通常是由感染的豬場傳給其他的豬、牛、羊之飼養場，因為牛羊等反芻動物很容易經由呼吸道感染。

認識口蹄疫後，各養畜戶應共同落實配合政府下列防疫政策，以確保養畜場內牛、豬的健康與安全。

一、加強牧場自衛防疫，包括：

1. 畜舍及其周邊加強並以2%鹼水、2-4%碳酸鈉、2%檸檬酸或合適消毒藥水加強消毒。

2. 使用高壓噴霧機加強畜舍牆壁、隔欄、床面、通道及圍牆全面噴霧消毒，磚造畜舍者可以高熱噴水消毒其縫隙。

3. 嚴格管制牧場人員、車輛及使用器材進出，並一律完成消毒步驟。

二、不要密飼或隨意引進來路不明的豬隻、牛隻。

三、配合政府政策與獸醫的指導，切實施打口蹄疫疫苗預防注射。

四、若發現罹患、疑患或可能感染口蹄疫之病徵時，迅即通報獸醫師或當地動物衛生防疫單位處理。

總之，為杜絕口蹄疫傳染病的發生，讓國內之畜牧產業能永續經營，惟有建立正確的防疫認知，並落實自衛防疫、完善的疫情通報與使用疫苗等，方可獲得有效的疫病防範效果。也可藉此再創我國畜牧產業發展的新契機。



大立花園



木瓜優良兩性株，組織
培養苗現貨供應。



負責人：江豐敏

地址：嘉義市鹿寮里186附1號 電話：05-2752671 • 0936-352233