

# 原生植物台灣野牡丹藤

## 可作為花卉盆栽 觀賞期有4個月之久

文圖 / 鍾秉興

**野**牡丹科植物分佈於熱帶及亞熱帶，據高雄區農業改良場說：全世界共有240屬，4,000餘種，觀賞價值極高。有鑑於此，高雄場自1998年開始著手進行品種蒐集，目前已先由南部地區蒐集到9屬11種，如鏞葉野牡丹、深山野牡丹、小金石榴、布勒德藤、金石榴、台灣野牡丹藤、野牡丹、金錦香、糙葉金錦香、台灣厚距花、東方肉穗野牡丹等。其中原生於台灣南部的台灣野牡丹藤，觀賞期可達4個月之久，為極佳的室內盆栽花卉。高雄區農業改良場調查發現，野生的台灣野牡丹藤，很有發展前途，該場將於88年底舉辦示範觀摩推廣。

台灣野牡丹藤為極稀有珍貴的台灣特種植物，族群僅分佈於台灣東南部，高雄

場黃雅玲小姐調查指出：在屏東恆春半島南仁山至台東大武一帶可見其芳踪。在觀賞價值上，既可觀花觀果又可觀葉，其花序頂生且成串聚集，頗似喜氣洋洋的連串炮竹，非常可愛，且果實隨成熟度而轉換不同顏色，極為喜氣；更甚者葉片呈現出細緻且亮麗無塵的視覺，頗令人心曠神怡。通常在自然狀況下，台灣野牡丹藤在種植第2年後，開始開花結果，花期幾乎為全年。關於栽培方法，黃小姐說：如用扦插繁殖時，其介質可用泥炭土、珍珠石、蛭石2：1：1之比例混合，存活率可達100%。在成苗管理上，水分及日照的控制，是栽培管理上的要點，在70%遮陰網下，其葉片質地翠綠堅硬，盆栽型態更為優美。病蟲害管理方面，台灣野牡丹藤極少有病害發生，最常見的蟲害為小蝸牛，可以6%聚乙醛水懸劑防治或施用，非農藥防治上用於草粉或苦茶渣。

